Bulletin de Surveillance Sanitaire

Polynésie française - N°39/2026

Données consolidées jusqu'à la semaine 44
(26/10/2026 au 01/11/2026)

ARASS
AGENCE DE RÉGULATION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Actualités

- **Phase épidémique de grippe en Polynésie française.**
- **Ebola : l'épidémie se poursuit en République démocratique du Congo.**

Tendances hebdomadaires

Dengue	IRA*	Covid	Leptospirose	GEA**
→	↗	→	→	→

*IRA : infection respiratoire aiguë / **GEA : gastroentérite aiguë; O : risque faible, O : risque modéré, O : risque élevé

Infections respiratoires aiguës


Pour réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la grippe, le VRS et la Covid, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des mesures très efficaces.

Grippe, Covid et VRS

En S44, la Polynésie française est en phase épidémique de grippe, avec 94 cas confirmés, majoritairement liés au virus de la grippe A, principalement de sous-type H1N1. On dénombre 32 hospitalisations et 3 décès. La circulation virale est actuellement détectée à Tahiti, Raiatea, aux Marquises et aux Tuamotu.

La vaccination contre la grippe et la COVID-19 reste la meilleure mesure de prévention et est hautement recommandée pour la population cible.

Evolution hebdomadaire des principaux indicateurs grippaux, à date de prélèvement, Polynésie française, 2025-2026



Avec l'entrée en phase épidémique de grippe, la veille sanitaire ne prend désormais plus en charge les prélèvements rhinopharyngés réalisés pour la recherche de germes respiratoires par PCR à des fins de surveillance.


Par ailleurs, 4 cas de COVID-19 ont été signalés.

Autres pathogènes respiratoires détectés aux laboratoires du CHPF et de l'ILM en S44 sont : coronavirus OC43, métapneumovirus, parainfluenza 3, rhino/entérovirus.

Surveillance syndromique des infections respiratoires aiguës (IRA) :

En S44, le nombre et la proportion de consultations pour IRA sont stables au niveau du territoire.

Cette stabilité des indicateurs en période d'épidémie de grippe est possiblement liée à la diminution du nombre de déclarants en semaine 43 et 44.




Zoonoses

Leptospirose :

Le risque de contracter la leptospirose est plus élevé dans les périodes suivant les épisodes pluvieux importants. Dans ces contextes, il est recommandé aux professionnels de santé de prescrire une RT-PCR d'emblée devant toute suspicion de leptospirose, suivie d'une antibiothérapie probabiliste (amoxicilline).

En S44, deux cas de leptospirose ont été rapportés, l'un à Raiatea et l'autre à Tahiti. L'un des cas a nécessité une hospitalisation en réanimation.

Il demeure essentiel de rappeler les mesures de prévention : protéger toute plaie avec des pansements étanches, porter des bottes ou chaussures fermées et éviter le contact avec les eaux ou la boue potentiellement contaminées.




GEA et TIAC

GEA : gastroentérites aiguës.

TIAC : toxi-infection alimentaire collective. Survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

Le laboratoire du CHPF indique la circulation de rotavirus.

En S44, un cas d'infection à Salmonella a été rapporté et a nécessité une hospitalisation. Le nombre et la proportion de consultations pour syndrome GEA sont en diminution.



Liens utiles

Retrouvez tous les BSS et MDO sur le site de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) :
https://www.service-public.pf/arass/

Ainsi que sur le site de la Direction de la santé :
https://www.service-public.pf/dsp/espace-pro-2/surveillance-epidemiologique

Les informations vaccinations Grippe et Covid en Polynésie française :
https://www.service-public.pf/dsp/Covid-19/vaccination-Covid/

Les informations internationales sont accessibles sur les sites de :

L'Organisation Mondiale de la Santé OMS
https://www.who.int

The Pacific Community SPC
https://www.spc.int/

L'European Center for Disease Control and Prevention ecdc
https://www.ecdc.europa.eu/en

Center for Disease Control and Prevention CDC24/7
https://www.cdc.gov/

Coordonnées du :

Centre de Lutte Contre la Tuberculose :
40.46.49.31 (médecin) ou 40.46.49.32 ou 33 (infirmière)
cellule.tuberculose@sante.gov.pf

Centre des Maladies Infectieuses et Tropicales :
40.48.62.05
cmit@cht.pf

L'équipe du Bureau de la veille sanitaire et de l'observation (BVSO) :

Responsable du bureau
Dr Henri-Pierre MALLET

Pôle veille sanitaire
Responsable du pôle
Dr André WATTIAUX

Epidémiologistes
Mihiau MAPOTOEKE
Pauline DOCHY

Infirmier
Tereva RENETEAUD

Pôle observation de la santé
Epidémiologiste
Annabelle LAPOSTOLLE

Infirmière
Heimoana DEGAGE

Téléphone :
Standard ARASS
40 48 82 35
BVSO
40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12
E-mail :
veille.sanitaire@administration.gov.pf

Remerciements

Ce bulletin est réalisé grâce aux données des médecins et infirmiers du réseau sentinelle, des structures de la Direction de la santé (dispensaires, infirmeries, hôpitaux périphériques et centres spécialisés), du Centre Hospitalier de Polynésie française, des laboratoires privés et publics, du service de santé des armées et des autres acteurs de santé de Polynésie française.