

BARBADINE SAUVAGE, POMME CALEBASSE paropatini, popotini

BARBADINE SAUVAGE POMME CALEBASSE



DESCRIPTION

- **Type** : plante ligneuse
- **Taille** : variable en fonction de l'âge, de 3 à 6 m voir plus¹
- **Feuille** : grandes feuilles alternées, ovales ou en forme de cœur (13-17 cm de diamètre)¹
- **Fleur** : grandes fleurs solitaires, blanches, jaunes et violettes, odorantes¹
- **Fruit** : gros fruits ronds charnus (3-4 cm de diamètre) vert-jaune devenant pourpre à maturité avec une coque lisse, épaisse et dure¹
- **Graine** : petites graines blanches

BIOLOGIE - ECOLOGIE

- **Modèle(s) de dispersion** : cochons, rats, oiseaux, hommes (fruit comestible)¹
- **Type(s) de végétation envahis(s)** en Polynésie française : forêts sèches et humides de basse et moyenne altitude¹
- **Habitat(s) potentiel(s)** : friche², bord de sentier, bord de rivière, zone cultivée, îsleire de forêt naturelle, forêt secondarisée
- **Altitudes** : 0-300 m¹

IMPACTS

Entre en compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments avec les plantes qu'il recouvre, menaçant leur survie¹. Augmente les coûts d'entretien des zones ouvertes (terrain de particuliers, infrastructures, planifications)

PRÉVENTION ET CONTRÔLE

- **Prévention** :
 - > Limiter le défrichage, les ouvertures de routes et de sentiers
 - > Eviter de propager les graines en transportant de la terre depuis des zones infestées et veiller à ne pas en véhiculer par le biais de terre ou de boue collées aux engins
- **Méthode physique et chimique** :
 - > **Pulvérisation sur feuillage** des jeunes plants d'une solution herbicide à base triclopyr ester ou de glyphosate, en veillant à ne pas atteindre la plante hôte, ou traitements des rejets après recoupe (coupe basse de la tige)¹¹

Fruit



Invasion d'un pandanus ^

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (Voir page 108)

CARTE DE RÉPARTITION
Page 93