



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

## Données du 27 Août au 9 Septembre 2018 (semaines 35 et 36)

### Communiqué de presse

La surveillance des maladies infectieuses en Polynésie française est effectuée chaque semaine par la déclaration volontaire des médecins sentinelles et des laboratoires.

#### Evolution du nombre de cas déclarés, par pathologie

Pathologie	Activité	Evolution
Leptospirose	Faible	→
Dengue	Faible	↘
Grippe	Modéré	↗
Diarrhée	Faible	↗

## Dengue

### - Dengue 1 :

- Circulation à Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea, Nuku-Hiva et Rangiroa
  - 21 cas confirmés et 2 cas probables (13 cas en semaine 35 et 10 cas en semaine 36)
  - 17,4 % d'enfants de moins de 15 ans
  - 17 sérotypés DENV-1
- Aucun passage codé par les urgences du CHPf sur 1 605 passages totaux.

#### Lutte contre la dengue

- élimination des gîtes larvaires en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d'eau douce une fois par semaine
- utilisation de moyens de protection individuelle : répulsifs anti-moustiques, moustiquaires, diffuseurs...

#### Prévention du sérotype 2

La Polynésie française continue d'être **à risque d'importation de la dengue de type 2** du fait que ce virus circule dans la zone Pacifique. Des personnes en provenance de zones à risque pour la dengue 2 participent parfois à des compétitions ou des événements internationaux. **Pour lutter contre les risques d'introduction du virus et d'épidémie, l'élimination des gîtes larvaires doit être continue : éliminer les moustiques, c'est éliminer le risque de se contaminer par le virus de la dengue.**

La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d'apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l'ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.

## Grippe

Activité grippale dans le réseau sentinelle, le nombre de consultations est en hausse par rapport à la quinzaine précédente. Il n'y a aucun cas confirmé de grippe cette quinzaine.

109 cas (63 en semaine 35 et 46 en semaine 36)

- Un passage codé par les urgences du CHPf sur 1 605 passages totaux

#### Recommandations

- Tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD = carnet rouge, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades
- Dans les lieux publics, à proximité d'une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue
- Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle
- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s'être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d'attente...)

## Leptospirose

Quatre cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine. Deux en semaine 35 et deux en semaine 36. Trois cas sur quatre ont pu être investigués : les facteurs de risque étaient le jardinage/fa'a'apu.

### Recommandations

- le **jardinage / fa'a'apu** est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées
- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce
- protéger les plaies avec un pansement imperméable
- limiter tous les contacts avec la boue et l'eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières
- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets
- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

## Diarrhée

Le nombre de cas déclarés s'élevait à 81 (31 cas en semaine 35 et 50 cas en semaine 36) dont 22,7 % d'enfants de moins de 4 ans. L'activité est en hausse dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.

### Recommandations

- lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes.
- dans l'entourage d'une personne malade, nettoyage et désinfection des toilettes et des poignées de portes chaque jour.
- en cas de diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.

## Méningite à éosinophile

Durant cette quinzaine, 1 cas a été déclaré en semaine 36. Le facteur de risque identifié est la consommation de légumes locaux mal lavés.

### Recommandations

- Contrôler la pullulation des rongeurs (rats) par la gestion des déchets.
- Eradiquer l'escargot *Achatina fulica*.
- **Éviter de consommer les crustacés crus et non préalablement congelés : chevrette (notamment dans le Taïoro), escargot, mollusque d'eau douce.** Ils doivent être cuits ou congelés pendant plus de 24 heures avant d'être consommés.
- Laver soigneusement les crudités avant consommation.
- Surveiller ce que les enfants mettent dans leur bouche, éviter qu'ils ne jouent avec des escargots ou des limaces.
- S'assurer que les enfants se lavent les mains après avoir joué par terre.

Bureau de veille sanitaire

Tél : 40 48 82 01

Fax : 40 48 82 12

Email : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)