



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 22 octobre au 4 novembre 2018 (semaines 43 et 44)
Communiqué de presse

La surveillance des maladies infectieuses en Polynésie française est effectuée chaque semaine par la déclaration volontaire des médecins sentinelles et des laboratoires.

Evolution du nombre de cas déclarés, par pathologie

Pathologie	Activité	Evolution
Leptospirose	Faible	→
Dengue	Faible	↘
Grippe	Faible	→
Diarrhée	Faible	↘

Leptospirose

Trois cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine : 3 en semaine 43. Les facteurs de risques identifiés étaient le jardinage/fa'a'apu, la baignade en rivière et la randonnée.

Recommandations

- **le jardinage / fa'a'apu** est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées
- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce
- protéger les plaies avec un pansement imperméable
- limiter tous les contacts avec la boue et l'eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières
- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets
- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

Dengue

Dengue 1 :

- . Circulation à Tahiti, Bora Bora, Moorea et Rangiroa.
 - 6 cas confirmés (4 cas en semaine 43 et 2 cas en semaine 44)
 - aucun enfant de moins de 15 ans
 - 2 sérotypés DENV-1
- . Aucun passage codé par les urgences du CHPf sur 1 475 passages totaux.

Lutte contre la dengue

- élimination des gîtes larvaires en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d'eau douce une fois par semaine
- utilisation de moyens de protection individuelle : répulsifs anti-moustiques, moustiquaires, diffuseurs...

Prévention du sérotype 2

La Polynésie française continue d'être **à risque d'importation des virus de la dengue de type 2 et 4** du fait que ces virus circulent dans la zone Pacifique. Des personnes en provenance de zones à risque pour ces virus participent parfois à des compétitions ou des événements internationaux. **Pour lutter contre les risques d'introduction de nouveaux virus et d'épidémies, l'élimination des gîtes larvaires doit être continue : éliminer les moustiques, c'est éliminer le risque de se contaminer par le virus de la dengue.**

La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d'apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l'ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.

Grippe

- Activité grippale dans le réseau sentinelle : le nombre de consultations est en baisse par rapport à la quinzaine précédente. 31 cas de syndromes grippaux (17 en semaine 43 et 14 en semaine 44) ont été déclarés par les médecins sentinelle.
- Aucun passage codé par les urgences du CHPf sur 1 475 passages totaux.
- Il n'y a aucun cas confirmé de grippe cette quinzaine.

Diarrhée

Le nombre de cas déclarés s'élevait à 57 (30 cas en semaine 43 et 27 cas en semaine 44) dont 47,4 % d'enfants de moins de 4 ans. L'activité est en baisse dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.

Recommandations

- lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes.
- dans l'entourage d'une personne malade, nettoyage et désinfection des toilettes et des poignées de portes chaque jour.
- en cas de diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.

Rhinopharyngites / Rhinopharyngitis

Durant cette quinzaine, l'activité des rhinopharyngites diminue par rapport aux semaines 41 et 42 mais reste toujours élevée. Malgré le fait que cette surveillance n'est pas systématique, 61 cas de rhinopharyngites ont été déclarés (35 en semaine 43 et 26 en semaine 44) contre 74 la quinzaine précédente.

Prévention de la rhinopharyngite

- Rhinopharyngite
- dans les lieux publics, à proximité d'une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue
- éternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir
- se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle
- se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s'être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés.

Tél : 40 48 82 01

Bureau de veille sanitaire
Fax : 40 48 82 12

Email : veille@sante.gov.pf