



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 3 au 16 décembre 2018 (semaines 49 et 50)
Communiqué de presse



Retour de la saison des pluies !

- La **leptospirose** est le risque infectieux le plus fréquent. Marcher pieds nus dans l'eau sale ou la boue augmente les risques de contact entre la peau et cette bactérie.
- La saison des pluies est propice à la prolifération des gîtes larvaires et des moustiques. Pour éviter la **dengue**, maladie à potentiel épidémique, éliminez les gîtes larvaires et protégez-vous contre les piqûres de moustiques.

La surveillance des maladies infectieuses en Polynésie française est effectuée chaque semaine par la déclaration volontaire des médecins sentinelles et des laboratoires.

Evolution du nombre de cas déclarés, par pathologie

Pathologie	Activité	Evolution
Leptospirose	Faible	→
Dengue	Faible	→
Syndromes grippaux	Faible	→
Diarrhée	Modérée	↗

Leptospirose

Cinq cas de leptospirose ont été déclarés durant cette quinzaine, 3 en semaine 49 et 2 en semaine 50. Trois cas ont pu être investigués : les facteurs de risque identifiés sont le jardinage / fa'a'apu et la marche pieds nus.

Recommandations

- le **jardinage / fa'a'apu** est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées
- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce
- protéger les plaies avec un pansement imperméable
- limiter tous les contacts avec la boue et l'eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières
- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets
- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

Grippe

- Activité grippale dans le réseau sentinelle : le nombre de consultations pour syndromes grippaux est stable par rapport à la quinzaine précédente : 64 cas (30 en semaine 49 et 34 en semaine 50) ont été déclarés par les médecins sentinelle.
- Il n'y a aucun cas confirmé de grippe durant cette quinzaine.

Rappel : campagne de vaccination contre la grippe en cours, du 6 décembre 2018 au 28 février 2019.

Diarrhée

Le nombre de cas déclarés s'élevait à 116 (60 cas en semaine 49 et 56 cas en semaine 50) dont 39 % d'enfants de moins de 4 ans. L'activité est en augmentation dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.

Recommandations

- lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes.
- dans l'entourage d'une personne malade, nettoyage et désinfection des toilettes et des poignées de portes chaque jour.
- en cas de diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.

Dengue

Dengue 1 :

- . Circulation à Bora Bora, Moorea, Rangiroa, Tahiti et Nuku-hiva.
 - 13 cas confirmés et 3 cas probables (5 cas en semaine 49 et 11 cas en semaine 50)
 - 10 enfants de moins de 15 ans
 - 11 sérotypés DENV-1

Lutte contre la dengue

La Polynésie française est toujours à risque d'importation d'autres sérotypes de dengue que la dengue 1. En effet, les sérotypes 2 et 4 circulent de façon sporadique dans la zone Pacifique. Pour lutter contre les risques d'introduction de nouveaux virus et d'épidémies, **l'élimination des gîtes larvaires doit être continue** en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d'eau douce une fois par semaine : **éliminer les moustiques, c'est éliminer le risque de se contaminer par le virus de la dengue.**

La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d'apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l'ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.

Tél : 40 48 82 01

Bureau de veille sanitaire

Fax : 40 48 82 12

Email : veille@sante.gov.pf