



Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 1^{er} au 14 juillet 2019 (semaines 27 et 28)

Communiqué de presse

La surveillance des maladies infectieuses en Polynésie française est effectuée chaque semaine par la déclaration volontaire des médecins sentinelles et des laboratoires.

Evolution du nombre de cas déclarés, par pathologie

Pathologie	Activité	Evolution
Grippe	Épidémique	↗
Dengue	Épidémique	↗
Leptospirose	Modérée	→
Diarrhée	Faible	→

Grippe

- Épidémie de grippe B depuis la semaine 27 de 2019.

- Activité grippale : le nombre de syndromes grippaux est en augmentation par rapport à la quinzaine précédente ; 316 cas (174 en semaine 27 et 142 en semaine 28) ont été déclarés par les médecins sentinelles.
- Durant cette quinzaine 22 cas confirmés de grippe B ont été déclarés : 5 en semaine 27 et 17 en semaine 28.

Recommandations

- Tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades
- Dans les lieux publics, à proximité d'une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue
- Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle.
- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s'être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d'attente...).

Dengue

- Epidémie de dengue 2 depuis le 10 avril 2019

Au 22/07/2019, 200 cas autochtones et 2 cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019.

- Tahiti est en phase d'épidémie : toutes les communes sont touchées sauf Mahaena, Afaahiti-Taravao, Pueu et Teahupoo
- Bora-Bora est en phase d'épidémie (au moins 3 cas sans lien épidémiologique) : Vaitape et Faanui sont touchées.
- Trois îles sont en phase d'alerte : Moorea (Papetoai) et Nuku-Hiva (Taiohae).

La dengue de type 2 n'ayant pas circulé dans le Pays depuis l'an 2000, la population est faiblement immunisée et l'épidémie pourra être de grande ampleur. Les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie française après 2000 sont les plus à risque d'être infectées.

Au-delà des actions de lutte anti-vectorielle mises en œuvre par la Direction de la santé (Centre d'hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, chacun peut être acteur pour limiter l'ampleur de cette épidémie par les actions suivantes :

1) Pour ne pas être infecté :


- éliminez chaque semaine les gîtes larvaires autour de votre domicile et de votre lieu de travail
- protégez-vous des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs...)

2) Si vous avez de la fièvre supérieure à 38°C, consultez un médecin. Ceci est d'autant plus important si vous venez de Tahiti et vous rendez dans une autre île de Polynésie française, non touchée par ce virus.


3) Si vous avez la dengue :

- protégez-vous des piqûres de moustiques pendant 10 jours
- limitez vos déplacements, pour ne pas contaminer d'autres zones géographiques.

Nombre de cas de dengue 2 du 10 février au 22 juillet 2019 dans les Iles du Vent par commune



Nombre de cas de dengue 2 du 10 février au 22 juillet 2019 dans les Iles sous le Vent et l'archipel des Marquises



- Bilan de la quinzaine

Semaine	Quinzaine 27-28	Depuis la semaine 6
Dengue non typée	14	83
Dengue 1	10	250
dont hospitalisé	0	13
dont cas sévères	0	1
Dengue 2	51	200
dont < 20 ans	27 (53%)	129 (65%)
dont hospitalisé	1	11
dont cas sévères	0	0

Lutte contre la dengue

Pour lutter contre les épidémies suite à l'introduction de nouveaux virus, **l'élimination des gîtes larvaires doit être continue** en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d'eau douce une fois par semaine.

La Direction de la santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d'apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l'ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.

Leptospirose

Neuf cas de leptospirose ont été déclarés durant cette quinzaine : cinq en semaine 27 et quatre en semaine 28. Sept cas ont pu être investigués : les facteurs de risque identifiés sont le jardinage/fa'a'apu, la marche pieds nus et la baignade en rivière.

Recommandations

- **le jardinage / fa'a'apu** est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées
- porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce
- protéger les plaies avec un pansement imperméable
- limiter tous les contacts avec la boue et l'eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières
- dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets
- après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

Diarrhée

Le nombre de cas déclarés s'élevait à 83 (53 cas en semaine 27 et 30 cas en semaine 28) dont 13% d'enfants de moins de 4 ans. L'activité est stable dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.

Recommandations

- lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes
- dans l'entourage d'une personne malade, nettoyage-désinfection quotidiens des toilettes et poignées de portes
- en cas de diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.

Gastro-entérite à Salmonelle

Durant cette quinzaine une TIAC a été déclaré.

Recommandations

- Hygiène : lavage des mains après être allé aux toilettes.
- La consommation de plats préparés doit respecter les chaînes du chaud (maintenir à +65°C avant de les servir) et du froid (entre 0°C et +4°C).
- Les volailles doivent être consommées bien cuites.
- Les œufs doivent être consommés de préférence bien cuits. Les préparations à base d'œufs non cuits doivent être réalisées avec des œufs dont la provenance est connue, le moins longtemps possible avant leur consommation et maintenues à +4°C.

Tél : 40 48 82 01

Bureau de veille sanitaire

Fax : 40 48 82 12

Email : veille@sante.gov.pf