



# **STATISTIQUES** des **CAUSES DE DECES** en **POLYNESIE FRANÇAISE** **2011-2015**

*ANALYSE DES CERTIFICATS MEDICAUX DE DECES*

*RAPPORT REDIGE PAR  
LE DISPOSITIF D'EXPLOITATION DES DONNEES DE SANTE  
DE LA DIRECTION DE LA SANTE*

Septembre 2019

**En collaboration avec :**

-  l'Institut de la Statistiques de Polynésie française ISPF (en particulier Mme Julie Pasquier)
-  la Fédération Nationale des Observatoire Régionaux de Santé FNORS (en particulier Mesdames Lise Trottet et Céline Leclerc)
-  Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès CépiDC

## Sommaire

- 1 Mortalité générale en Polynésie française toutes causes confondues sur la période 2011-2015 5**
  - 1.1 Nombre moyen annuel de décès : 5*
  - 1.2 Mortalité infantile moyenne sur 1000 naissances : 6*
- 2 Mortalité par cause en Polynésie française sur la période 2011-2015 7**
  - 2.1 Principales causes de décès chez la femme en Pf sur 2011-2015 : 7*
  - 2.2 Principales causes de décès chez l'homme en Pf sur 2011-2015 : 10*
  - 2.3 La surmortalité masculine en Pf sur 2011-2015 : 13*
- 3 Principales causes de mortalité prématurée en Polynésie française en 2011-2015 13**
- 4 Comparaison de la mortalité entre la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie 15**
- 5 Tableau récapitulatif selon la cause de décès pour la période 2011-2015 15**
  - Annexe 1 : Le taux standardisé de mortalité masculine et féminine de la Pf en 2015 par rapport à d'autres régions du monde 18*
  - Annexe 2 : les causes de mortalité prématurée évitable 20*

## Figures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Effectif moyen annuel de décès par âge quinquennal et sexe entre 2011 et 2015 en Pf - CCD11-15 Pf.                                                                                                                                                                         | 6  |
| Figure 2: Taux de mortalité infantile dans certains territoires ou pays dans le monde - CCD11-15 Pf.                                                                                                                                                                                 | 6  |
| Figure 3: Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf.                                                                                                            | 7  |
| Figure 4 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par cancer en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                                                                 | 8  |
| Figure 5 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies cardio-vasculaires en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                                            | 9  |
| Figure 6 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies de l'appareil respiratoire en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                                    | 9  |
| Figure 7 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par causes externes de blessures et d'empoisonnements en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                      | 10 |
| Figure 8: Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf.                                                                                                           | 10 |
| Figure 9 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies cardio-vasculaires en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                                           | 11 |
| Figure 10 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par cancer en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                                                               | 12 |
| Figure 11 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par causes externes de blessures et d'empoisonnements en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf                                                    | 12 |
| Figure 12: Ratio du TSM chez les hommes par rapport au TSM chez les femmes selon les causes de décès en Pf sur les périodes 2005-2010 e 2011-2015 - CCD11-15 Pf                                                                                                                      | 13 |
| Figure 13 : Taux de mortalité standardisé sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population mondiale de référence (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité prématurée en Polynésie française, chez les hommes et chez les femmes sur la période 2011-2015 - CCD11-15 Pf | 14 |
| Figure 14 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité en Polynésie française Pf et en Nouvelle Calédonie NC- CCD11-15 Pf                                                                                                              | 15 |
| Figure 15 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité en Polynésie française Pf et en Nouvelle Calédonie NC- CCD11-15 Pf                                                                                                             | 15 |
| Figure 16 : Taux standardisés de mortalité masculine (TSM) en 2015, dans différentes régions du monde.                                                                                                                                                                               | 18 |
| Figure 17 : Taux standardisés de mortalité féminine (TSM) en 2015, dans différentes régions du monde.                                                                                                                                                                                | 18 |
| Figure 18 : Taux standardisés de mortalité masculine (TSM) dus aux maladies non transmissibles en 2015, dans différentes régions du monde.                                                                                                                                           | 19 |
| Figure 19 : Taux standardisés de mortalité féminine (TSM) dus aux maladies non transmissibles en 2015, dans différentes régions du monde.                                                                                                                                            | 19 |

# 1 MORTALITE GENERALE EN POLYNESIE FRANÇAISE TOUTES CAUSES CONFONDUES SUR LA PERIODE 2011-2015

## Définition des indicateurs (cf. au document sur la méthodologie)

- ✓ **Le taux brut** correspond au rapport du nombre de décès survenus, pendant une période donnée, sur la population totale moyenne de la Polynésie française (Pf). Ce taux est exprimé pour 100 000 habitants.
- ✓ **Le taux de mortalité standardisé (TMS)** correspond au taux de mortalité en Pf sur une période donnée, ajusté en fonction d'une distribution standard par âge de la population mondiale de référence (SEGI). Les taux standardisés sont exprimés pour 100 000 habitants.
- ✓ **l'indice de surmortalité masculine** correspond au rapport du taux standardisé de mortalité masculin sur le taux standardisé de mortalité féminin
- ✓ **la mortalité prématurée** correspond aux décès survenus avant l'âge de 65 ans.

|                                                            | 2005-2010 |       |          | 2011-2015 |       |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|
|                                                            | Homme     | Femme | Ensemble | Homme     | Femme | Ensemble |
| <b>Effectif moyen</b> de décès par an                      | 710       | 499   | 1209     | 812       | 585   | 1397     |
| Taux <b>brut</b> de mortalité générale                     | 530,7     | 392,4 | 463,5    | 589,3     | 442,9 | 517,7    |
| Taux <b>standardisé</b> de mortalité générale              | 676,0     | 460,1 | 567      | 590,0     | 403,1 | 495,7    |
| Surmortalité masculine                                     |           | 1,47  |          |           | 1,46  |          |
| Taux <b>standardisé</b> de mortalité prématurée (< 65 ans) | 292,2     | 179,9 | 237,9    | 272,9     | 180,7 | 228,2    |

## 1.1 NOMBRE MOYEN ANNUEL DE DECES :

En 2015, en Polynésie française (Pf) on comptabilisait 178 décès en plus qu'en 2011 (+14 %) avec une population générale qui avait augmenté d'environ 6200 personnes entre 2011 et 2015 (+2 %) en particulier dans la tranche d'âge des plus de 50 ans (+15 % entre 2011 et 2015).

En moyenne, entre 2011 et 2015, on comptabilisait **1397 décès par an avec 58,1 % d'hommes**

**Près de 3 décès sur 5 survenaient à partir de l'âge de 65 ans** (59,4 % du nombre de décès moyen 2011-2015).




Figure 1: Effectif moyen annuel de décès par âge quinquennal et sexe entre 2011 et 2015 en Pf - CCD11-15 Pf.


## 1.2 MORTALITE INFANTILE MOYENNE SUR 1000 NAISSANCES :

### Définition des indicateurs (cf. au document sur la méthodologie)

Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès d'enfants de moins de 1 an rapporté aux naissances vivantes. Il est estimé sur 1000 naissances vivantes.

Le taux de mortalité infantile en Pf sur la période était estimé à **6,7 pour 1000 naissances en Pf**

La Figure 2 présente le taux de mortalité infantile dans plusieurs régions ou pays du monde.



\*source : Numéro 525 de septembre 2015- Population et sociétés « Tous les pays du monde (2015) de l'INED.

Figure 2: Taux de mortalité infantile dans certains territoires ou pays dans le monde - CCD11-15 Pf.

La principale cause de mortalité infantile était représentée par **les affections dans la période périnatale (10 décès annuels en moyenne)**. Les anomalies liées à la brièveté de la gestation, au retard de croissance et/ou à un poids insuffisant à la naissance expliquaient la survenue en moyenne de 2,2 décès par an sur la période 2011-2015.

Sur 5 ans, on dénombrait 3 décès par mort subite du nourrisson (R.95) soit un taux de 0,14 pour 1000 naissances. D'après l'observatoire national de la mort inattendue du nourrisson, la France est l'un des pays à fort taux de mort subite du nourrisson ou mort inattendue du nourrisson (MIN) au sein de l'Europe avec 400 à 500 décès par an. C'est l'une des principales causes de décès chez l'enfant entre 1 mois et 1 an. En France, le taux était de 0,38 pour 1000 naissances (2000-2005) et en Nouvelle Calédonie sur 27 ans (1991-2016), il était de 0,67.

## 2 MORTALITE PAR CAUSE EN POLYNESIE FRANÇAISE SUR LA PERIODE 2011-2015

### 2.1 PRINCIPALES CAUSES DE DECES CHEZ LA FEMME EN PF SUR 2011-2015 :

La Figure 3 représente le taux standardisé de mortalité (TSM) pour 100 000 femmes en Pf selon les principales causes de décès sur la période 2005-2010 et 2011-2015.




Figure 3: Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf.

En Pf, chez la femme, les trois principales causes de mortalité tous âges confondus sur 2011-2015 étaient, **les maladies de l'appareil circulatoire** (155,8 décès annuels en moyenne, 26,6 % des causes de décès, avec un TSM de 105,2 décès pour 100 000 femmes), **les tumeurs** (152,8 décès annuels en moyenne, 26,1% des causes de décès, avec un TSM de 105,9 décès pour 100 000 femmes sur la période) **et les maladies de l'appareil**

**respiratoire** (49,4 décès annuels en moyenne, 8,4%, avec un TSM de 32,5 décès pour 100 000 femmes sur la période).

Sur les 5 ans, ces 3 causes représentaient 61% des causes de décès chez la femme.

Concernant les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, le TSM liés au diabète était passé de 12,2 décès pour 100 000 femmes en 2005-2010 à 14,9 décès pour 100 000 femmes en 2011-2015.

Concernant les maladies du système nerveux, le TSM liés à la maladie d'Alzheimer était passé de 4,3 décès pour 100 000 femmes en 2005-2010 à 7,2 décès pour 100 000 femmes en 2011-2015.

Les 10 premières causes de décès par tumeurs malignes en Polynésie française sont représentées dans la Figure 4. Le cancer du larynx, des bronches et des poumons et le cancer du sein restaient en 2011-2015 comme en 2005-2010 responsables de plus 40% des décès par cancer en Pf.




Figure 4 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par cancer en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

Les principales causes de décès par maladies de l'appareil cardiovasculaire sont représentées dans Figure 5. Les maladies cérébro-vasculaires (hémorragies cérébrales, accidents vasculaires cérébraux...) restaient depuis 2005 responsable en moyenne d'un tiers des décès par maladies de l'appareil cardiovasculaire.






Figure 5 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies cardio-vasculaires en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

**Plus de 40% des décès de l'appareil respiratoire** étaient dus aux maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Figure 6). Parmi celles-ci, l'asthme était responsable de 3,4 décès annuels en moyenne (TSM= 2,4 décès pour 100 000 femmes) et les maladies pulmonaires obstructives chroniques de 14,2 décès annuels soit un TSM de 9,1 décès pour 100 000 femmes.




Figure 6 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies de l'appareil respiratoire en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

**Les décès suite à des causes externes de blessure et d'empoisonnement** chez les femmes étaient passés d'un TSM de 26 pour 100 000 femmes en 2005-2010 à un TSM de 18,5 (Figure 7).

En 2005-2010, les décès dans le cadre d'un accident des transports étaient responsables chez la femme de 26% des décès par causes externes alors qu'en 2011-2015, ils étaient impliqués dans 10% des décès par causes externes (TSM de 6,2 *versus* 2,1 pour 100 000 femmes).




Figure 7 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les principales causes de décès par causes externes de blessures et d'empoisonnements en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

## 2.2 PRINCIPALES CAUSES DE DECES CHEZ L'HOMME EN PF SUR 2011-2015 :

La Figure 8 représente le taux standardisé de mortalité (TSM) pour 100 000 femmes en Pf selon les principales causes de décès.




Figure 8: Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf.

En Pf, chez l'homme, les trois principales causes de mortalité tous âges confondus sur 2011-2015 étaient, **les maladies de l'appareil circulatoire** (208,2 décès par an en moyenne et 25,7% des causes de décès, avec un TSM de 152,3 décès pour 100 000 hommes sur la période), **les tumeurs** (197,2 décès annuel en moyenne et 24,3% des causes de décès, avec un TSM de 140,2 décès pour 100 000 hommes sur la période) **et les causes externes de blessures et d'empoisonnements** (75,4 décès annuels en moyenne et 9,3%, avec un TSM de 51,6 décès pour 100 000 hommes sur la période).

En moyenne sur les 5 ans, ces 3 causes représentaient 59,2% des causes de décès chez l'homme.

Comme chez la femme, le TSM liés à la maladie d'Alzheimer était passé de 1,9 décès pour 100 000 hommes en 2005-2010 à 4,6 décès pour 100 000 hommes en 2011-2015.

Les principales causes de décès par maladies de l'appareil cardiovasculaire chez l'homme sont représentées dans la Figure 9. Les maladies ischémiques (infarctus du myocarde, angine de poitrine...) restaient comme en 2005-2010 responsables en moyenne de 30% des décès par maladies de l'appareil cardiovasculaire chez l'homme.




Figure 9 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par maladies cardiovasculaires en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

Les 10 premières causes de décès par tumeurs malignes en Polynésie française chez l'homme sont représentées dans la Figure 10. Le cancer du larynx, des bronches et des poumons et le cancer de la prostate restaient en 2011-2015 comme en 2005-2010 responsables de plus 40% des décès par cancer en Pf.




Figure 10 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par cancer en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

**Les décès suite à des causes externes de blessure et d'empoisonnement** (Figure 11) chez les hommes étaient passés d'un TSM de 69,6 pour 100 000 hommes en 2005-2010 à un TSM de 51,6. En 2005-2010, les décès dans le cadre d'un accident des transports étaient responsables chez l'homme de 28% des décès par causes externes alors qu'en 2011-2015, ils étaient impliqués dans 18% des décès par causes externes (TSM de 18,3 *versus* 9,2 pour 100 000 hommes).




Figure 11 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les principales causes de décès par causes externes de blessures et d'empoisonnements en Polynésie française, sur la période 2011-2015 et 2005-2010 - CCD11-15 Pf

### 2.3 LA SURMORTALITE MASCULINE EN PF SUR 2011-2015 :

En 2011-2015 comme en 2005-2010, la part des décès masculins avait été supérieure à celle des décès féminins (respectivement 812 versus 585) ; **le TSM a été 1,5 fois plus élevé chez les hommes par rapport aux femmes toutes causes confondues** (Figure 12).

La plus forte surmortalité masculine (2,8) avait été observée pour les causes externes de blessure et d'empoisonnement en particulier dans le cadre des décès par accidents de transport (4,3), par suicide (3,2) et par noyade(3,5).

Il existait **une inversion du ratio homme/femme pour les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métabolique avec une légère surmortalité féminine (0,96)**.

De même, le TSM pour la maladie d'Alzheimer (maladie du système nerveux) était 1,5 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme.




Figure 12: Ratio du TSM chez les hommes par rapport au TSM chez les femmes selon les causes de décès en Pf sur les périodes 2005-2010 e 2011-2015 - CCD11-15 Pf

## 3 PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITE PREMATUREE EN POLYNESIE FRANÇAISE EN 2011-2015

Au cours de la période 2011-2015, 40,6 % des décès sont survenus avant 65 ans (567,6 décès en moyenne par an en Pf). Chez les hommes, 43% des décès (352,0) étaient survenus avant 65 ans contre 37% (215,6) chez les femmes.

Comme en 2005-2010, les 3 principales causes de décès prématurés en 2011-2015 chez l'homme comme chez la femme (Figure 12) étaient, **les tumeurs, les maladies de l'appareil circulatoire et les causes externes de blessures et d'empoisonnements**.




Figure 13 : Taux de mortalité standardisé sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population mondiale de référence (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité prématurée en Polynésie française, chez les hommes et chez les femmes sur la période 2011-2015 - CCD11-15 Pf

Chez la femme, les **2 principales causes tumorales de décès prématurés** (42% de l'ensemble des causes par cancer) étaient les tumeurs malignes du **sein** (18,6 décès annuels, TSM de 13,5 pour 100 000 femmes), et les tumeurs du **larynx, des bronches et des poumons** (13,4 décès, TSM de 10,6 décès pour 100 000 femmes).

Chez l'homme, **1 décès prématuré par cancer sur 3 était dû au cancer du larynx, des bronches et des poumons** (27,8 décès, TSM de 20,1 décès pour 100 000 hommes).

Concernant les causes de décès de l'appareil circulatoire, les causes principales **chez la femme étaient les maladies cérébro-vasculaires** (11,8 décès prématurés avec un TSM de 9 décès pour 100 000 femmes) et **chez l'homme, les cardiopathies ischémiques** (25,2 décès prématurés avec un TSM de 17,4 décès pour 100 000 hommes).

Concernant les causes externes de blessures et d'empoisonnement, **les suicides étaient la première cause de décès prématurés chez la femme** (5,8 décès prématurés et un TSM de 4,2 décès avant 65 ans pour 100 000 femmes) et **chez l'homme** (19,8 décès prématurés et un TSM de 13,8 décès avant 65 ans pour 100 000 hommes). Les accidents de transport venaient en seconde position chez l'homme comme chez la femme.

Le taux standardisé de mortalité prématurée était 1,5 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L'écart était particulièrement marqué pour les accidents de transport (x4,9), les maladies du foie (x3,7), les noyades (x3,5), les suicides (x3,3) et les tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (x3,3).

Annexe2 : Causes de mortalité prématurée évitable

## 4 COMPARAISON DE LA MORTALITE ENTRE LA POLYNESIE FRANÇAISE ET LA NOUVELLE-CALEDONIE

Chez la femme comme chez l'homme, **les 2 principales causes de mortalité en Nouvelle Calédonie (NC) comme en Polynésie française (Pf) étaient les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire**. La troisième cause de décès en NC en 2013 était représentée par les causes externes de blessures et d'empoisonnement.




Figure 14 : Taux standardisé de mortalité féminine (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité en Polynésie française Pf et en Nouvelle Calédonie NC- CCD11-15 Pf




Figure 15 : Taux standardisé de mortalité masculine (TSM) selon les 3 principales causes de mortalité en Polynésie française Pf et en Nouvelle Calédonie NC- CCD11-15 Pf

## 5 TABLEAU RECAPITULATIF SELON LA CAUSE DE DECES POUR LA PERIODE 2011-2015

Ci dessous, se trouvent respectivement les tableaux récapitulatifs de la mortalité générale et de la mortalité prématurée selon les principales causes de décès en Polynésie sur la période 2011-2015.

| Causes de décès de Polynésie française - période 2011-2015 | Code OMS<br>CIM-10 | Homme             |                |                  | Femme             |                |                  | Ensemble          |                |                  | Ratio<br>H/F <sup>4</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                                                            |                    | Nbre <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> | TSM <sup>3</sup> | Nbre <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> | TSM <sup>3</sup> | Nbre <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> | TSM <sup>3</sup> |                           |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE</b>                 | <b>I00-I99</b>     | <b>208,2</b>      | <b>25,7%</b>   | <b>152,3</b>     | <b>155,8</b>      | <b>26,6%</b>   | <b>105,2</b>     | <b>364</b>        | <b>26,1%</b>   | <b>128,1</b>     | <b>1,4</b>                |
| Mal. cérébrovasculaires                                    | I60-I69            | 46,8              | 5,8%           | 34,3             | 48,4              | 8,3%           | 32,3             | 95,2              | 6,8%           | 33,3             | 1,1                       |
| Cardiopathie ischémique                                    | I20-I25            | 61                | 7,5%           | 43,0             | 29,2              | 5,0%           | 20,6             | 90,2              | 6,5%           | 31,7             | 2,1                       |
| Insuffisance cardiaque                                     | I30-I52            | 19,6              | 2,4%           | 14,8             | 15,2              | 2,6%           | 10,0             | 34,8              | 2,5%           | 12,3             | 1,5                       |
| Mal. hypertensives                                         | I10-I15            | 13,8              | 1,7%           | 11,1             | 15,6              | 2,7%           | 10,4             | 29,4              | 2,1%           | 10,7             | 1,1                       |
| Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque       | I00-I02            | 0,8               | 0,1%           | 0,6              | 0,6               | 0,1%           | 0,4              | 1,4               | 0,1%           | 0,5              | 1,5                       |
| <b>TUMEURS</b>                                             | <b>C00-D48</b>     | <b>197,2</b>      | <b>24,3%</b>   | <b>140,2</b>     | <b>152,8</b>      | <b>26,1%</b>   | <b>105,9</b>     | <b>350</b>        | <b>25,1%</b>   | <b>122,1</b>     | <b>1,3</b>                |
| <b>Tumeurs malignes</b>                                    | <b>C00-C99</b>     | <b>189,6</b>      | <b>23,4%</b>   | <b>134,9</b>     | <b>145,8</b>      | <b>24,9%</b>   | <b>101,2</b>     | <b>335,4</b>      | <b>24,0%</b>   | <b>117,2</b>     | <b>1,3</b>                |
| TM. du larynx, bronches, poumons                           | C32-C34            | 64,6              | 8,0%           | 46,0             | 32,4              | 5,5%           | 22,3             | 97                | 6,9%           | 34,3             | 2,1                       |
| TM. du sein                                                | C50                | 0,4               | 0,0%           | 0,3              | 31                | 5,3%           | 21,3             | 31,4              | 2,2%           | 10,7             | -                         |
| TM. Tissus lymphoïde, hématopoïétique                      | C81-C96            | 12,6              | 1,6%           | 9,2              | 8,2               | 1,4%           | 5,7              | 20,8              | 1,5%           | 7,3              | 1,6                       |
| TM. de la prostate                                         | C61                | 19                | 2,3%           | 14,2             | -                 | -              | -                | -                 | -              | -                | -                         |
| TM. du foie                                                | C22                | 14                | 1,7%           | 9,4              | 3,8               | 0,6%           | 2,6              | 17,8              | 1,3%           | 6,0              | 3,7                       |
| TM. du pancréas                                            | C25                | 11                | 1,4%           | 7,4              | 6,2               | 1,1%           | 4,6              | 17,2              | 1,2%           | 6,0              | 1,6                       |
| TM. du côlon et du rectum                                  | C18-20             | 8                 | 1,0%           | 5,8              | 6,8               | 1,2%           | 4,9              | 14,8              | 1,1%           | 5,4              | 1,2                       |
| TM. de l'estomac                                           | C16                | 8,2               | 1,0%           | 5,9              | 3                 | 0,5%           | 1,9              | 11,2              | 0,8%           | 3,9              | 3,0                       |
| TM. de l'utérus, autres que le col                         | C54-C55            | -                 | -              | -                | 9,6               | 1,6%           | 7,0              | -                 | -              | -                | -                         |
| TM. lèvre, cavité buccale et pharynx                       | C00-C14            | 7                 | 0,9%           | 4,9              | 2,2               | 0,4%           | 1,6              | 9,2               | 0,7%           | 3,3              | 3,1                       |
| TM. de l'ovaire                                            | C56                | -                 | -              | -                | 7,6               | 1,3%           | 5,4              | -                 | -              | -                | -                         |
| TM. du col de l'utérus                                     | C53                | -                 | -              | -                | 4,2               | 0,7%           | 2,8              | -                 | -              | -                | -                         |
| TM. de l'oesophage                                         | C15                | 5,6               | 0,7%           | 3,8              | 1,4               | 0,2%           | 1,0              | 7                 | 0,5%           | 2,5              | 3,8                       |
| TM. De la vessie                                           | C67                | 3,8               |                | 3,0              | 2,8               |                | 1,9              | 6,6               |                | 2,4              | 1,6                       |
| Tumeurs malignes du SNC                                    | C69-C72            | 2                 | 0,2%           | 1,3              | 3,8               | 0,6%           | 2,9              | 5,8               | 0,4%           | 2,1              | 0,5                       |
| Mélanomes et tumeurs peau                                  | C43-C44            | 3,8               | 0,5%           | 2,7              | 1,2               | 0,2%           | 0,8              | 5                 | 0,4%           | 1,7              | 3,6                       |
| TM. de la thyroïde                                         | C73                | 1,6               | 0,2%           | 1,0              | 2,8               | 0,5%           | 1,9              | 4,4               | 0,3%           | 1,5              | 0,5                       |
| TM. du rein                                                | C64                | 1,8               | 0,2%           | 1,2              | 2,4               | 0,4%           | 1,7              | 4,2               | 0,3%           | 1,5              | 0,7                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE</b>                 | <b>J00-J99</b>     | <b>60,2</b>       | <b>7,4%</b>    | <b>44,1</b>      | <b>49,4</b>       | <b>8,4%</b>    | <b>32,5</b>      | <b>109,8</b>      | <b>7,9%</b>    | <b>38,1</b>      | <b>1,4</b>                |
| Mal. chroniques des VRI                                    | J40-J47            | 25                | 3,1%           | 17,4             | 22                | 3,8%           | 14,2             | 47                | 3,4%           | 15,7             | 1,2                       |
| Mal. pulmonaires obstructives chroniques                   | J44                | 17                | 2,1%           | 12,0             | 14,2              | 2,4%           | 9,1              | 31,2              | 2,2%           | 10,4             | 1,3                       |
| Pneumonie                                                  | J12-J18            | 11,6              | 1,4%           | 8,6              | 8,8               | 1,5%           | 6,0              | 20,4              | 1,5%           | 7,3              | 1,4                       |
| Asthme                                                     | J45-J46            | 3,6               | 0,4%           | 2,4              | 3,4               | 0,6%           | 2,4              | 7                 | 0,5%           | 2,4              | 1,0                       |
| Grippe                                                     | J10-J11            | 0,6               | 0,1%           | 0,6              | 0,6               | 0,1%           | 0,4              | 1,2               | 0,1%           | 0,5              | 1,6                       |
| <b>CAUSES EXTERNES</b>                                     | <b>V01-Y98</b>     | <b>75,4</b>       | <b>9,3%</b>    | <b>51,6</b>      | <b>26,8</b>       | <b>4,6%</b>    | <b>18,5</b>      | <b>102,2</b>      | <b>7,3%</b>    | <b>35,3</b>      | <b>2,8</b>                |
| Suicides                                                   | X60-X84            | 21,2              | 2,6%           | 14,0             | 6,4               | 1,1%           | 4,4              | 27,6              | 2,0%           | 9,2              | 3,2                       |
| Accidents de transport                                     | V01-Y99            | 13,6              | 1,7%           | 9,2              | 2,8               | 0,5%           | 2,1              | 16,4              | 1,2%           | 5,7              | 4,3                       |
| Noyade                                                     | W65-W74            | 8,4               | 1,0%           | 5,7              | 1,8               | 0,3%           | 1,6              | 10,2              | 0,7%           | 3,7              | 3,5                       |
| Agressions                                                 | X85-Y09            | 0,6               | 0,1%           | 0,3              | 1                 | 0,2%           | 0,7              | 1,6               | 0,1%           | 0,5              | 0,5                       |
| <b>MALADIES ENDOC., NUTRI. ET METABOLIQUES</b>             | <b>E00-E90</b>     | <b>31,8</b>       | <b>3,9%</b>    | <b>22,8</b>      | <b>33,8</b>       | <b>5,8%</b>    | <b>23,7</b>      | <b>65,6</b>       | <b>4,7%</b>    | <b>23,4</b>      | <b>1,0</b>                |
| Diabète                                                    | E10-E14            | 21,6              | 2,7%           | 15,5             | 21                | 3,6%           | 14,9             | 42,6              | 3,0%           | 15,5             | 1,0                       |
| Obésité                                                    | E65-E68            | 4,4               | 0,5%           | 2,7              | 4,6               | 0,8%           | 3,2              | 9                 | 0,6%           | 2,9              | 0,8                       |
| <b>MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES</b>               | <b>A00-B99</b>     | <b>36,8</b>       | <b>4,5%</b>    | <b>26,9</b>      | <b>25,8</b>       | <b>4,4%</b>    | <b>17,4</b>      | <b>62,6</b>       | <b>4,5%</b>    | <b>22,2</b>      | <b>1,5</b>                |
| Septicémies                                                | A40-A41            | 19,2              | 2,4%           | 13,6             | 12,8              | 2,2%           | 8,5              | 32                | 2,3%           | 11,2             | 1,6                       |
| Mal. intestinales infectieuses                             | A00-A09            | 3,2               | 0,4%           | 2,7              | 3,2               | 0,5%           | 2,3              | 6,4               | 0,5%           | 2,4              | 1,2                       |
| Fièvres virales transmises par des moustiques              | A92-A99            | 2,6               | 0,3%           | 1,8              | 2,4               | 0,4%           | 1,6              | 5                 | 0,4%           | 1,8              | 1,1                       |
| Tuberculose                                                | A15-A19, B90       | 2,6               | 0,3%           | 2,0              | 1,2               | 0,2%           | 0,8              | 3,8               | 0,3%           | 1,3              | 2,6                       |
| Leptospirose                                               | A27                | 1,2               | 0,1%           | 0,7              | 0,4               | 0,1%           | 0,3              | 1,6               | 0,1%           | 0,5              | 2,6                       |
| <b>TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT</b>                 | <b>F00-F99</b>     | <b>9,2</b>        | <b>1,1%</b>    | <b>6,7</b>       | <b>5,8</b>        | <b>1,0%</b>    | <b>3,7</b>       | <b>15</b>         | <b>1,1%</b>    | <b>5,2</b>       | <b>1,8</b>                |
| Abus d'alcool (y compris psychose alcoolique)              | F10                | 1,2               | 0,1%           | 0,9              | 0,6               | 0,1%           | 0,4              | 1,8               | 0,1%           | 0,7              | 2,2                       |
| Pharmacodépendance et toxicomanie                          | F11-16, F18-19     | 0,2               | 0,0%           | 0,2              | 0                 | 0,0%           | 0,0              | 0,2               | 0,0%           | 0,1              | -                         |
| <b>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX</b>                         | <b>G00-G99</b>     | <b>24,4</b>       | <b>3,0%</b>    | <b>18,1</b>      | <b>26,6</b>       | <b>4,5%</b>    | <b>18,0</b>      | <b>51</b>         | <b>3,7%</b>    | <b>18,2</b>      | <b>1,0</b>                |
| Mal. d'Alzheimer                                           | G30                | 5,8               | 0,7%           | 4,6              | 11,6              | 2,0%           | 7,2              | 17,4              | 1,2%           | 6,0              | 0,6                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF</b>                     | <b>K00-K93</b>     | <b>27,2</b>       | <b>3,4%</b>    | <b>20,3</b>      | <b>16,4</b>       | <b>2,8%</b>    | <b>11,1</b>      | <b>43,6</b>       | <b>3,1%</b>    | <b>15,7</b>      | <b>1,8</b>                |
| Mal. du foie                                               | K70-K77            | 6,4               | 0,8%           | 4,7              | 3                 | 0,5%           | 2,2              | 9,4               | 0,7%           | 3,4              | 2,2                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE</b>              | <b>N00-N99</b>     | <b>14,2</b>       | <b>1,7%</b>    | <b>10,9</b>      | <b>14,6</b>       | <b>2,5%</b>    | <b>9,7</b>       | <b>28,8</b>       | <b>2,1%</b>    | <b>10,2</b>      | <b>1,1</b>                |
| Insuffisance rénale chronique                              | N18                | 7,8               | 1,0%           | 5,9              | 6,6               | 1,1%           | 4,2              | 14,4              | 1,0%           | 5,0              | 1,4                       |
| <b>AFFECTIONS DANS LA PERIODE PERINATALE</b>               | <b>P00-P96</b>     | <b>5</b>          | <b>0,6%</b>    | <b>5,5</b>       | <b>5</b>          | <b>0,9%</b>    | <b>6,0</b>       | <b>10</b>         | <b>0,7%</b>    | <b>5,7</b>       | <b>0,9</b>                |
| <b>MALFORMATIONS CONG. ET ANOMALIES CHROMO.</b>            | <b>Q00-Q99</b>     | <b>3,4</b>        | <b>0,4%</b>    | <b>3,4</b>       | <b>1,2</b>        | <b>0,2%</b>    | <b>1,2</b>       | <b>4,6</b>        | <b>0,3%</b>    | <b>2,3</b>       | <b>2,9</b>                |
| <b>SYMPTOMES, ETAT MORBIDES MAL DEFINIS</b>                | <b>R00-R99</b>     | <b>104,4</b>      | <b>12,9%</b>   | <b>76,7</b>      | <b>63</b>         | <b>10,8%</b>   | <b>45,1</b>      | <b>167,4</b>      | <b>12,0%</b>   | <b>61,0</b>      | <b>1,7</b>                |
| Syndrome de la mort subite du nourrisson                   | R95                | 0,6               | 0,1%           | 0,7              | 0                 | 0,0%           | 0,0              | 0,6               | 0,0%           | 0,3              | -                         |
| Causes inconnues ou non précisées                          | R96, R97, R98      | 73,8              | 9,1%           | 52,9             | 37,2              | 6,4%           | 27,3             | 111               | 7,9%           | 40,2             | -                         |
| <b>TOTAL TOUTES CAUSES</b>                                 |                    | <b>811,6</b>      | <b>100%</b>    | <b>590,0</b>     | <b>585</b>        | <b>100%</b>    | <b>403,1</b>     | <b>1396,8</b>     | <b>100%</b>    | <b>495,7</b>     | <b>1,5</b>                |

<sup>1</sup>effectifs moyens par an sur la période 2011-2015 ; <sup>2</sup> part de la cause de décès sur l'ensemble des causes de la période 2011-2015 pour les femmes, pour les hommes et ensemble ; <sup>3</sup>Taux de mortalité par an, standardisé sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population mondiale de référence (SEGI) ; <sup>4</sup> rapport du taux standardisé chez l'homme sur le taux standardisé chez la femme



| Causes de décès de Polynésie française - période 2011-2015 -<br>MORTALITE PREMATUREE             | Code OMS<br>CIM-10 | Homme             |                | Femme             |                | Ensemble          |                | Ratio<br>H/F <sup>4</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                                  |                    | Nbre <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> | Nbre <sup>2</sup> | % <sup>2</sup> | Nbre <sup>3</sup> | % <sup>2</sup> |                           |
| <b>TUMEURS</b>                                                                                   | C00-D48            | 79,6              | 22,6%          | 56,5              | 35,2%          | 155,4             | 27,4%          | 1,0                       |
| <b>Tumeurs malignes</b>                                                                          | C00-C99            | 77                | 21,9%          | 54,7              | 33,8%          | 149,8             | 26,4%          | 1,0                       |
| TM du larynx, bronches, poumons                                                                  | C32-C34            | 27,8              | 7,9%           | 20,1              | 6,2%           | 41,2              | 7,3%           | 1,9                       |
| TM du sein                                                                                       | C50                | 0,2               | 0,1%           | 0,2               | 0,1%           | 18,8              | 3,3%           | 0,0                       |
| TM du foie                                                                                       | C22                | 7,2               | 2,0%           | 4,8               | 1,1%           | 9,6               | 1,7%           | 3,3                       |
| TM du Tissus lymphoïde, hématopoïétique                                                          | C81-C96            | 4,6               | 1,3%           | 3,3               | 1,6%           | 2,5               | 0,4%           | 1,3                       |
| TM du pancréas                                                                                   | C25                | 5,2               | 1,5%           | 3,5               | 1,2%           | 2,2               | 0,4%           | 1,6                       |
| TM de l'estomac                                                                                  | C16                | 5,2               | 1,5%           | 3,8               | 1,0%           | 1,6               | 0,3%           | 2,3                       |
| TM lèvre, cavité buccale et pharynx                                                              | C00-C14            | 4,2               | 1,2%           | 3,1               | 0,6%           | 1,0               | 0,2%           | 3,3                       |
| TM de l'utérus, autres que le col                                                                | C54-C55            | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              | -                         |
| TM du côlon et du rectum                                                                         | C18-C20            | 1,8               | 0,5%           | 1,3               | 0,3%           | 1,9               | 0,3%           | 0,7                       |
| TM du SNC                                                                                        | C69-C72            | 1,2               | 0,3%           | 0,8               | 0,2%           | 2,4               | 0,4%           | 0,3                       |
| TM de l'ovaire                                                                                   | C56                | -                 | -              | -                 | -              | -                 | -              | -                         |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE</b>                                                       | I00-I99            | 69,4              | 19,7%          | 49,3              | 19,7%          | 32,7              | 11,8%          | 1,5                       |
| Cardiopathie ischémique                                                                          | I20-I25            | 25,2              | 7,2%           | 17,4              | 4,4%           | 7,3               | 3,4%           | 2,4                       |
| maladies cérébrovasculaires                                                                      | I60-I69            | 14,6              | 4,1%           | 10,7              | 5,5%           | 9,0               | 4,7%           | 1,2                       |
| <b>CAUSES EXTERNES</b>                                                                           | V01-Y98            | 57,6              | 16,4%          | 41,0              | 14,6%          | 72,2              | 12,7%          | 3,6                       |
| Suicides                                                                                         | X60-X84            | 19,8              | 5,6%           | 13,8              | 2,7%           | 4,2               | 2,5%           | 3,3                       |
| accidents de transport                                                                           | V01-Y99            | 12,2              | 3,5%           | 8,7               | 2,2%           | 1,8               | 1,4%           | 4,9                       |
| noyade                                                                                           | W65-W74            | 7,2               | 2,0%           | 5,1               | 0,7%           | 1,4               | 1,6%           | 3,3                       |
| <b>AFF. DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE</b>                                   | P00-P96            | 5                 | 1,4%           | 10,6              | 2,3%           | 11,3              | 1,8%           | 0,9                       |
| Anomalies liées à la brièveté de la gestation, poids de naissance insuffisant, retard croissance | P05-P07            | 1,4               | 0,4%           | 1,7               | 1,0%           | 2,8               | 0,6%           | 0,6                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE</b>                                                       | J00-J99            | 16,2              | 4,6%           | 11,6              | 5,1%           | 8,4               | 4,8%           | 1,4                       |
| Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures                                          | J40-J47            | 7,4               | 2,1%           | 5,2               | 2,7%           | 4,3               | 2,3%           | 1,2                       |
| Maladies pulmonaires obstructives chroniques                                                     | J44                | 3,6               | 1,0%           | 2,7               | 1,2%           | 2,0               | 1,1%           | 1,3                       |
| Pneumonie                                                                                        | J12-J18            | 3,4               | 1,0%           | 2,3               | 0,7%           | 1,2               | 0,9%           | 1,9                       |
| Asthme                                                                                           | J45-J46            | 2,2               | 0,6%           | 1,5               | 0,9%           | 1,5               | 0,7%           | 1,0                       |
| <b>MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES</b>                                                     | A00-B99            | 16                | 4,5%           | 12,1              | 8,6%           | 6,9               | 4,3%           | 1,8                       |
| Septicémies bactériennes                                                                         | A30-A49            | 9,8               | 2,8%           | 7,5               | 1,9%           | 3,1               | 2,5%           | 2,4                       |
| Mal. intestinales infectieuses                                                                   | A00-A09            | 1                 | 0,3%           | 1,0               | 0,6%           | 1,8               | 0,4%           | 0,5                       |
| <b>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX</b>                                                               | G00-G99            | 11,2              | 3,2%           | 9,8               | 3,7%           | 7,3               | 3,4%           | 1,4                       |
| Epilepsie, état de mal épileptique                                                               | G40, G41           | 3,4               | 1,0%           | 1,9               | 1,2%           | 1,0               | 1,1%           | 2,0                       |
| <b>MALADIES ENDO-, NUTRI. ET METABOLIQUES</b>                                                    | E00-E90            | 12,2              | 3,5%           | 8,6               | 4,2%           | 6,9               | 3,7%           | 1,2                       |
| diabète                                                                                          | E10-E14            | 7,6               | 2,2%           | 5,6               | 2,1%           | 3,6               | 2,1%           | 1,5                       |
| Obésité                                                                                          | E65-E68            | 3,8               | 1,1%           | 2,4               | 1,5%           | 2,3               | 1,2%           | 1,1                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF</b>                                                           | K00-K93            | 10,8              | 3,1%           | 8,8               | 2,5%           | 4,6               | 2,9%           | 1,9                       |
| maladies du foie                                                                                 | K70-K77            | 4                 | 1,1%           | 3,2               | 0,6%           | 0,9               | 0,9%           | 3,7                       |
| <b>MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE</b>                                                    | N00-N99            | 4,2               | 1,2%           | 3,5               | 2,2%           | 3,7               | 1,6%           | 1,0                       |
| Insuffisance rénale chronique                                                                    | N18                | 1,8               | 0,5%           | 1,4               | 0,7%           | 1,2               | 0,6%           | 1,2                       |
| <b>MALF. CONG. ET ANOMALIES CHROMO.</b>                                                          | Q00-Q99            | 3,4               | 1,0%           | 5,4               | 0,5%           | 1,7               | 0,8%           | 3,2                       |
| <b>TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT</b>                                                       | F00-F99            | 1                 | 0,3%           | 0,8               | 0,4%           | 0,6               | 0,3%           | 1,5                       |
| <b>TOTAL TOUTES CAUSES</b>                                                                       |                    | 352               | 100%           | 272,9             | 100%           | 180,7             | 100%           | 1,5                       |

<sup>1</sup>effectifs moyens par an sur la période 2011-2015 ; <sup>2</sup> part de la cause de décès prématuré sur l'ensemble des causes de la période 2011-2015 pour les femmes, pour les hommes et ensemble ; <sup>3</sup>Taux de mortalité prématurée par an, standardisé sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population mondiale de référence (SEGI) ; <sup>4</sup> rapport du taux standardisé chez l'homme sur le taux standardisé chez la femme

## ANNEXE 1 : LE TAUX STANDARDISE DE MORTALITE MASCULINE ET FEMININE DE LA PF EN 2015 PAR RAPPORT A D'AUTRES REGIONS DU MONDE

### Sources des estimations mondiales OMS :

[https://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disease/estimates/en/](https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/)

Summary tables of mortality estimates by cause, age and sex, globally and by region, 2000–2016

### Mortalité générale (2015):




Figure 16 : Taux standardisés de mortalité masculine (TSM) en 2015, dans différentes régions du monde.




Figure 17 : Taux standardisés de mortalité féminine (TSM) en 2015, dans différentes régions du monde.

### Mortalité par Maladies non transmissibles (2015):

Définition de l'indicateur : (Who methods and data sources for country-level causes of death 2000-2016) <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A86o?lang=en>

Les codes CIM-10 définissant les maladies non transmissibles par l'OMS sont : C00-C97, D00-D48, D55-D64 (sans D 64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98 (sans G14), H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99, X41-X42, X44, X45, R95




Figure 18 : Taux standardisés de mortalité masculine (TSM) dus aux maladies non transmissibles en 2015, dans différentes régions du monde.




Figure 19 : Taux standardisés de mortalité féminine (TSM) dus aux maladies non transmissibles en 2015, dans différentes régions du monde.

## ANNEXE 2 : LES CAUSES DE MORTALITE PREMATUREE EVITABLE

### Définition de l'indicateur :

**La mortalité prématurée évitable a été définie** par le CépiDC à partir des causes de mortalité suivantes, considérées comme pouvant être évitées par une réduction des comportements individuels à risque (en lien avec des actions de prévention) : les cancers des voies aérodigestives supérieures, de l'œsophage et du poumon, les psychoses alcooliques, les cirrhoses, les accidents de la circulation, les chutes accidentelles, les suicides et le sida.

Cette liste n'est toutefois ni exhaustive ni exclusive. Il serait intéressant de redéfinir cet indicateur au niveau de la Polynésie en y ajoutant d'autres causes de décès.

La mortalité prématurée considérée comme évitable représentait 177,8 décès en moyenne par an sur la période 2011-2015 (126,4 hommes et 51,4 femmes) soit **31,3% du total des décès prématurés**. Les tumeurs malignes du Larynx, des bronches et des poumons représentaient plus de la moitié des décès prématurés évitables (51,1% chez l'homme et 63,0% chez la femme).

| Causes de décès évitables de Polynésie française - période 2011-2015 | Code CIM_10    | effectifs moyens par an |              |              | % sur le total (toutes causes évitables confondues) |             |             | TSM          |              |              | Ratio H/F  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                      |                | Hommes                  | Femmes       | Ensemble     | Hommes                                              | Femmes      | Ensemble    | Hommes       | Femmes       | Ensemble     |            |
| TM du larynx, bronches, poumons                                      | C32-C34        | 64,6                    | 32,4         | 97           | 51,1%                                               | 63,0%       | 54,6%       | 20,1         | 10,4         | 15,4         | 1,9        |
| Suicides                                                             | X60-X84, Y87.0 | 21,2                    | 6,4          | 27,6         | 16,8%                                               | 12,5%       | 15,5%       | 13,8         | 4,2          | 9,1          | 3,3        |
| Accidents de transport                                               | V01-V89        | 13,6                    | 2,8          | 16,4         | 10,8%                                               | 5,4%        | 9,2%        | 8,7          | 1,8          | 5,3          | 4,9        |
| Chutes accidentelles                                                 | W00-W19        | 9,6                     | 4            | 13,6         | 7,6%                                                | 7,8%        | 7,6%        | 2,7          | 0,4          | 1,6          | 7,0        |
| TM lèvre, cavité buccale et pharynx                                  | C00-C14        | 7                       | 2,2          | 9,2          | 5,5%                                                | 4,3%        | 5,2%        | 3,1          | 1,0          | 2,1          | 3,3        |
| TM de l'oesophage                                                    | C15            | 5,6                     | 1,4          | 7            | 4,4%                                                | 2,7%        | 3,9%        | 2,1          | 0,1          | 1,2          | 14,8       |
| Cirrhose alcoolique                                                  | K70,K74.6      | 3,6                     | 1,6          | 5,2          | 2,8%                                                | 3,1%        | 2,9%        | 1,8          | 0,4          | 1,1          | 3,9        |
| abus d'alcool (y compris psychose alcoolique)                        | F10            | 1,2                     | 0,6          | 1,8          | 0,9%                                                | 1,2%        | 1,0%        | 0,5          | 0,3          | 0,4          | 1,8        |
| Sida et infection par le VIH                                         | B20-B24        | 0                       | 0            | 0            | 0,0%                                                | 0,0%        | 0,0%        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -          |
| <b>total mortalité prématurée évitable</b>                           |                | <b>126,4</b>            | <b>51,4</b>  | <b>177,8</b> | <b>100%</b>                                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>52,7</b>  | <b>18,5</b>  | <b>36,2</b>  | <b>2,8</b> |
| <b>total mortalité prématurée</b>                                    | A00-Y89        | <b>352</b>              | <b>215,6</b> | <b>567,6</b> |                                                     |             |             | <b>272,9</b> | <b>180,7</b> | <b>228,2</b> | <b>1,5</b> |

**Direction de la santé en Polynésie française**

58, Rue des Poilus Tahitiens / B.P. 611 Papeete - 98713 Tahiti

Tél. : (+689) 40.46.00.05 - Fax : (+689) 40.43.00.74

E-mail : [secretariat@sante.gov.pf](mailto:secretariat@sante.gov.pf)