1. Cas confirmé

Toute personne, symptomatique ou non, avec une <u>confirmation virologique</u> d'infection COVID-19 par RT-PCR SARS-CoV-2.

2. Cas cliniquement suspect relevant d'une confirmation virologique

Toute personne présentant un des signes suivants (Fig1), de survenue brutale et avec ou sans notion de retour de voyage et/ou de contact étroit avec un cas confirmé ¹:

- Fièvre (ou sensation de fièvre), frissons
- Toux, mal de gorge et nez qui coule
- Difficultés à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine
- Fatigue intense inexpliquée
- Douleurs musculaires inexpliquées
- Maux de tête inhabituels
- Perte de l'odorat
- Perte du goût des aliments
- Diarrhée

Chez l'enfant : tous les signes cités *supra* (altération de l'état général, diarrhée ou fièvre isolée chez le nourrisson de moins de 3 mois).

Chez la personne âgée : altération brutale de l'état général ou des capacités mentales, de la confusion, des chutes répétées, une aggravation rapide d'une maladie déjà connue.

En situation d'urgence : difficultés à respirer, troubles du rythme cardiaque d'apparition récente, atteinte myocardique aigüe, évènement thromboembolique grave.

Confusion • · Céphalée Rhinite Signes généraux: Anosmie - Odynophagie Fièvre Agueusie • **Asthénie** Dyspnée Douleur thoracique Toux Age > 80 ans: Chutes répétées Eruption cutanée Troubles cognitifs Diarrhée Syndrome confusionnel Faiblesse musculaire Myalgie Paresthésies -Atteintes cliniques typiques ou initialement décrites Atteintes cliniques atypiques ou initialement non décrites Guan WJ et al. NEJM 2020 Feb Bangash MN et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020 Mar Hua A et al. Eur Heart J 2020 Mar Joob B et al. J Am Acad Dermatol 2020 Mar Lechien JR et al. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020 Apr 7hao H et al. Lancet Neurol 2020 Apr. Moriguchi T et al. Int J Infect Dis 2020 Apr Sala S et al. Fur Heart L 2020 Apr

Fig1: Présentation clinique de la COVID-19²

3. Cas asymptomatique relevant d'une confirmation virologique

- Personne identifiée comme contact étroit d'un cas confirmé¹, après évaluation du risque par le BVS.
- Personne présentant un autotest positif dans le cadre du dispositif « COV-CHECK PORINETIA » de l'ILM.

² Source COREB: https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/covid19-coreb-dia25juin2020.pdf



¹ Un contact étroit est une personne qui a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personnels prodiguant des soins à un cas confirmé en l'absence de moyens de protection adéquats