Tel: 40 48 82 01 Fax: 40 48 82 12 Astreinte de veille sanitaire

Tel: 87 70 65 02

(En dehors des heures d'ouverture du BVS)



Bulletin de surveillance sanitaire Polynésie française

Données du 10 au 23 février 2020 (semaines 07 et 08)

SYNTHESE / SUMMARY

Pathologies	Activité	Evolution
Grippe	Élevée	7
Dengue	Épidémique	A
Leptospirose	Faible	\rightarrow
Diarrhée	Modérée	Я

ALERTES INTERNATIONALES

Rougeole

Une émergence de la rougeole est observée dans toutes les régions du monde et des épidémies sont actuellement en cours dans plusieurs pays de la zone Pacifique :

- <u>Épidémie en Nouvelle-Zélande</u> : aucun nouveau cas de rougeole déclaré depuis la semaine 6 de 2020.
- Épidémie aux îles Samoa: aucun nouveau cas de rougeole déclaré depuis le 14/01/2020.
- Samoa Américaines: aucun nouveau cas de rougeole déclaré depuis le 27/01/2020.
- Épidémie aux Tonga: 659 cas déclarés au 12/02/2020 dont 78 confirmés en laboratoire.
- <u>Circulation en Australie</u> : aucun nouveau cas de transmission locale de rougeole depuis les trois dernier mois.
- Kiribati : aucun nouveau cas de rougeole déclaré depuis le 10/01/2020
- Papouasie-Nouvelle-Guinée: 4 cas confirmés au 14/01/2020

En Polynésie française, la vaccination est obligatoire depuis 1987. Du fait des échanges fréquents au niveau de la zone, malgré une bonne couverture vaccinale, le risque d'introduction du virus de la rougeole au Fenua est bien réel. Les personnes à risque de contracter l'infection sont celles non ou incomplétement vaccinées (une seule dose) ou n'ayant pas eu la maladie dans l'enfance. La vaccination, mesure de protection individuelle et collective, est le seul moyen efficace de prévenir la rougeole.

Epidémie d'infection due au nouveau coronavirus (Covid-19)

Une alerte sanitaire a été déclarée en janvier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suite au cas de pneumopathies rapportés dans la ville de Wuhan, en Chine, dues à un nouveau coronavirus (le SARS-CoV-2, inconnu jusqu'ici chez l'Homme).

La transmission interhumaine est avérée (observation de clusters et transmission de patients à soignants) mais les données disponibles à ce jour ne permettent pas d'évaluer le degré de facilité avec lequel le virus se transmet d'Homme à Homme.

À l'heure actuelle, le risque d'introduction en Polynésie française du virus est considéré comme possible.

À ce jour, aucun cas de coronavirus Covid-19 n'a été détecté en Polynésie française.

Recommandations pour les personnes revenant d'une zone de circulation du virus avec transmission entre personnes, ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19, ET présentant des signes cliniques (fièvre, toux, difficultés à respirer) durant 14 jours après leur retour¹:

- Lavez-vous régulièrement les mains (savon ou solution hydro alcoolique) et utiliser des mouchoirs jetables
- Prenez votre température matin et soir pendant 14 jours
- Porter un masque chirurgical en cas de contact avec d'autres personnes
- Privilégier le télétravail et éviter les sorties non indispensables (restaurants, cinéma, grands rassmeblements, etc.)
- <u>Contacter rapidement le Samu Centre 15</u>, en faisant état des symptômes ET du séjour dans une zone de circulation du virus ou d'une exposition à risque, afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée.

Il est recommandé de ne pas se rendre directement chez son médecin, dans un dispensaire ou aux urgences pour éviter toute potentielle transmission à d'autres personnes.

Patient suspect (<14 jours après exposition) ET exposition compatible ▶ Contacter le Centre 15

Les recommandations actualisées pour les professionnels de santé et les voyageurs sont disponibles sur le site de la Direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/professionnels-sante-covid-19/

¹ Définition de cas (04/02/2020) : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/epidemie-de-coronavirus-2019-ncov-au-depart-de-wuhan-chine

ACTUALITES LOCALES / LOCAL NEWS

Dengue / Dengue fever

Épidémie de dengue 2 (DENV-2)

Au 23/02/2020, 2 688 cas autochtones et 2 cas importés de DENV-2 ont été déclarés.

- lles en phase épidémique : Tahiti (10/04/2019), Bora-Bora (12/07/2019), Moorea (12/08/2019), Nuku Hiva (27/08/2019), Raiatea (12/09/2019), Huahine (13/09/2019), Rangiroa (19/09/2019), Ua Pou (27/09/2019), Tahaa (7/10/2019), Hiva Oa (8/10/2019), Ua Huka (9/10/2019), Tubuai (9/10/2019), Fatu Hiva (10/10/2019) et Rurutu (04/03/2020).
- lles en phase d'alerte: Takaroa, Maupiti, Tikehau, Arutua, Tureia et Tahuata

Informations pour les prescripteurs :

- Devant un syndrome « dengue-like » prescrire :
- Jusqu'à J7: test NS1 ou RT-PCR pour confirmation virologique d'une suspicion clinique
- Après J7 : sérologie

Rappeler aux patients de se protéger contre les piqûres de moustiques et de limiter leurs déplacements.

Réaliser une lutte permanente contre les gites larvaires autour des lieux de consultation.

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée (≥ 38,5° C) d'apparition brutale de moins de 8 jours ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat virologique positif (AgNS1 / RT PCR / IgM)

Semaine	Quinzaine 07-08 de 2020	Depuis la semaine 6 de 2019
Dengue non typée	28*	591*
Dengue 1 dont	0	298
hospitalisés	0	18
cas sévères	0	2
Dengue 2 dont	41*	2 690
< 20 ans	14 (34,1%)	1 397 (51,9%)
Hospitalisés	4 (9,8%)	121 (4,5%)
Formes sévères	0	1
Décès	0	1**



^{*} à partir de la semaine 42 (changement de stratégie de diagnostique) les analyses NS1 positives sont considérées comme dengue 2.

0

16

18 20 22 24 26

Syndromes « dengue-like »



36

42 4


2020

Nombre hebdomadaire de syndromes "dengue-like" vus en consultation par les médecins sentinelles

Attention : de S50-2019 à S1-2020, tenir compte de la période des vacances scolaires et des fêtes (diminution des données remontées par les médecins sentinelles).

30


2019



^{**} indirectement lié à la dengue


Circulation antérieure des sérotypes de dengue en Pf

Tous les sérotypes du virus de la dengue ont circulé de façon sporadique ou épidémique dans la zone Pacifique.





Circulation de la dengue et autres arbovirus en Polynésie française, 1946-2016 (Institut Louis Malardé). DV: Virus de la dengue (sérotypes -1, -2, -3 et -4); ZIKV (Virus Zika); CHIKV (Virus du Chikungunya). Les zones pleines correspondent aux épidémies, les zones hachurées aux périodes de co-circulation de plusieurs sérotypes de dengue, les zones en transparence aux périodes de circulation endémique.

Nombre de cas de dengue 2* du 10 février 2019 au 23 février 2020 dans les lles du Vent par commune



Nombre de cas de dengue 2* du 10 février 2019 au 23 février 2020 dans les lles sous le Vent et l'archipel des Marquises






Recommandations pour la prévention de la dengue

- Se protéger contre les piqûres de moustiques, particulièrement les personnes symptomatiques et leur entourage, afin de réduire le risque de transmission secondaire du virus (répulsifs en spray ou créme et moustiquaire).
- Lutter contre les gites larvaires en éliminant les eaux stagnantes dans son environnement (une fois/semaine, il est essentiel de vider les soucoupes et autres récipients, vérifier l'écoulement des gouttières, protéger toute zone de stagnation d'eau douce, pneus, etc.).
- Consulter rapidement son médecin en cas d'apparition de symptômes (fièvre, douleurs musculaires ou articulaires, etc.).

Leptospirose / Leptospirosis



cas de reprospirose ont eté déclares cette quinzante (en 507).

Recommandations pour la prévention de la leptospirose

- Le jardinage / faapu est un facteur de risque → port de gants et de chaussures fermées, surtout lorsqu'il pleut
- Lors de la pêche en eau douce → port de bottes / cuissardes
- Protection des plaies avec un pansement imperméable avant toute activité à risque
- Après une exposition à risque →lavage et désinfection des plaies
- Limiter les contacts avec la boue et l'eau douce trouble → ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble ou aux embouchures des rivières
- Dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets.
- Consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

Diarrhée et gastro-entérite aigue / Diarrhea and acute gastroenteritis

Syndrome diarrhée aiguë: au moins 3 selles liquides ou molles par jour datant de moins de 14 jours et motivant la consultation.



Activité en baisse dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente : 50 cas déclarés (37 en S07 et 13 en S08), 40 % des cas ont moins de 4 ans.

En moyenne il y a 1,3 consultation pour diarrhée par médecin du réseau sentinelle.

Signalement d'un cas d'infection à Salmonella spp. (S07).

Recommandations pour la prévention des gastroentérites


- Hygiène → lavage systématique des mains après être allé aux toilettes et avant de manipuler des aliments
- Nettoyage et désinfection des toilettes, des poignées de portes à effectuer quotidiennement dans l'entourage d'un malade
- La consommation de plats préparés doit respecter les chaînes du chaud (maintenir à +65°C avant de les servir) et du froid (entre 0°C et +4°C). Volailles et œufs doivent être consommés bien cuits. Les préparations à base d'œufs non cuits doivent être réalisées le moins longtemps possible avant leur consommation et conservées à +4°C en attendant

! En cas diarrhées et/ou vomissements importants, réhydrater la personne et consulter un médecin.

Grippe et autres virus respiratoires / Influenza-like illness

- Syndromes grippaux : activité est stable par rapport à la quinzaine précédente ; 78 cas déclarés par les médecins sentinelles (55 en S07 et 23 en S08).
- Dix cas confirmé de grippe A déclaré cette quinzaine (4 en S07 et 6 en S08).
 Le nombre de cas confirmé de la semaine 08 est égal au seuil épidémique des cas confirmé de grippe en Polynésie française.
 ! Une épidémie de grippe A est possible dans les semaines qui suivent.

Syndrome grippal : fièvre élevée (≥ 38,5°C) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL.



Recommandations pour la prévention de la grippe

- Porter un masque en cas de toux (dans les lieux publics et en famille);
- Eternuer se couvrant la bouche avec un mouchoir ; Se moucher dans un mouchoir à usage unique
- Se laver les mains fréquemment (après chaque éternuement ou mouchage, passage dans un lieu public, etc.).
- Tenir les personnes fragiles (sujets âgés ou à risque, femmes enceintes, etc.) à distance des personnes malades

! Il est recommandé d'être vigilants vis-à-vis d'une possible augmentation des cas de grippe dans les prochaines semaines (prélèvement nasopharyngé devant tout syndrome grippal).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES / REGIONAL AND INTERNATIONAL NEWS (Sources : PacNet, OMS, ProMed, SPC, ECDC)

Surveillance zone Pacifique [http://www.spc.int/phd/epidemics/ https://www.pphsn.net/rossp/index.htm]

Dengue / Dengue [02 mars 2020]

- DEN-1 : épidémie aux îles Cooks depuis le 27/02/2019
- DEN-2 : épidémie aux îles Wallis et Futuna le 21/11/2019
- DEN-3 : épidémie à Palau depuis le 07/12/2018, aux Etats Fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall depuis le 06/08/2019.

Surveillance France Outre-mer (hors Pacifique)

Dengue / Dengue [20 février 2020]

- Épidémie en Guadeloupe depuis la semaine 27 de 2019 → sérotype majoritaire DENV-2
- Épidémie en Guyane depuis la semaine 21 de 2019 → DENV-2 et DENV-1
- Épidémie en Martinique → sérotype majoritaire DENV-3 et DENV-2
- Circulation à la Réunion depuis 2017 → reprise de l'épidémie en 2020 avec 146 cas confirmé du 17 au 23 février. sérotype majoritaire DENV-1, quelques cas de DENV-2 et DENV-3 → Circulation des trois sérotypes de dengue.

Surveillance internationale

Ebola / Ebola (au 24 février 2020)

Depuis le 1^{er} août 2018, nouvelle épidémie en République Démocratique du Congo (toujours en cours) → 3 444 cas (3 310 confirmés et 134 probables) dont un total de 2 264 décès (66%).

Fièvre Jaune / Yellow Fever (au 03 février 2020)

La fièvre jaune est présente à l'état endémique dans certains pays d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique du Sud. La mortalité liée à la maladie est élevée. Le moustique *Aedes aegypti*, principal vecteur du virus, est présent en Pf. De plus, la Pf accueille régulièrement des voyageurs en provenance des zones à risque.

Le seul moyen d'éviter l'introduction du virus sur notre territoire est la vaccination des voyageurs.

La lutte anti-vectorielle (dégîtage, pulvérisation) ainsi que l'application de répulsifs cutanés ne sont pas à négliger.

Recommandation et obligation vaccinales concernant la fièvre jaune

En vertu du Règlement sanitaire international (RSI), la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 9 mois ayant séjourné dans un pays d'endémie (notamment certains pays d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique du Sud) et souhaitant se rendre / revenir en Polynésie française.

Avant de se rendre dans un pays à risque, les voyageurs doivent se faire vacciner au Centre de vaccinations internationales (tel : 40 48 62 05).

	Nombre dans la quinzaine	Total 2020
Angiostrongylose nerveuse	0	0
Botulisme	0	0
rucellose	0	0
ancer	Fera l'objet d'un rapport annuel.	
harbon	0	0
hikungunya	0	0
Choléra	0	0
oqueluche	0	2
Dengue (hors période épidémique)	0	0
Diphtérie	0	0
ièvre jaune	0	0
ièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes	0	0
ièvres hémorragiques virales	0	0
ilariose lymphatique	0	1
lépatite A aiguë	1	1
lépatite B aiguë	1	3
lépatite B chronique	1	1
lépatite C aiguë	0	0
lépatite C chronique	0	0
lépatite E aiguë	0	1
nfection invasive à méningocoque	0	1
nfection par le VIH	0	0
égionellose	0	0
èpre	0	0
eptospirose	4	11
istériose	0	0
Orthopoxviroses dont variole	0	0
Paludisme autochtone et d'importation	0	2
Peste	0	0
Poliomyélite	0	0
Rage	0	0
Rhumatisme articulaire aigu (RAA)	2	7
Rougeole	0	0
Valadie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes		
ransmissibles humaines	0	0
Saturnisme de personnes mineures	0	0
Syphilis	3	10
étanos	0	0
oxi-infections alimentaires collectives	0	1
uberculose	3	9
rularémie	0	0
yphus exanthématique	0	0
ika	0	0
Arboviroses autres que celles figurant dans la liste ci-dessus	0	0
Autres pathologies infectieuses faisant l'objet d'une alerte locale, nationale,	0	0
régionale ou internationale	0	O

Fiches de déclaration téléchargeables sur le site de la Direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/fiches-maladies-declaration-obligatoire/

REMERCIEMENTS

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Centre Hospitalier du Taaone

- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Maison médicale de garde
- Service de Santé des Armées

La mobilisation des professionnels reste essentielle, en période épidémique comme en période inter-épidémique

Merci de nous adresser chaque semaine

vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées

Rappel du Codage CIM-10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11 - Suspicion de dengue : A90 - A91 - Syndrome Zika : A 928

- Diarrhées : A02 à A09 - Fièvre isolée : R509 - Syndrome Chikungunya : A 920

BUREAU DE VEILLE SANITAIRE

Dr Sabine HENRY, Yoann Teissier, Aurélie Vigouroux, Elodie Benhamza, Aurélie Domecq, Sherilyn Mou

Tél: 40 48 82 01 Fax: 40 48 82 12 Astreinte: 87 70 65 02 Mail: veille@sante.gov.pf