

MALAISES AU DECOURS D'UNE VACCINATION ANNEXE G : ALLERGIE GRAVE

Type de malaise	Symptômes	Conduite à tenir
Hypersensibilité immédiate	<p>Seule complication grave, nécessite une intervention immédiate, rare (fréquence évaluée à 1/100 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ due à une allergie à l'un des composants injectés ou à une réaction anaphylactoïde ➤ la réaction survient dans les minutes qui suivent l'injection (jusqu'à trente minutes). ➤ deux formes cliniques isolées ou associées, s'accompagnant parfois de signes digestifs (vomissements, diarrhée) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ forme respiratoire : dyspnée, respiration sifflante, oedème du visage et des muqueuses ORL, anxiété, sensation de détresse ➤ forme systémique avec choc : oedème, rougeur et prurit généralisés, sensation de malaise, pouls rapide et difficile à palper (« filant »), baisse de la pression artérielle, pouvant conduire à une perte de connaissance. 	<p>Allonger immédiatement le patient :</p> <p>en position demi-assise s'il existe des signes respiratoires à plat dos, jambes surélevées, en l'absence de signes respiratoires Position Latérale de Sécurité (PLS) si inconscient En cas d'arrêt cardiorespiratoire , débiter le massage cardiaque externe</p> <p>Appeler ou faire appeler le SAMU - Centre 15 en précisant le motif : « choc anaphylactique » ou « oedème de Quincke »</p> <p>Appliquer le protocole de prise en charge CHOC ALLERGIQUE</p>

Rédaction : Dr JM Ségalin Bureau des programmes des programmes de pathologies infectieuses – Direction de la santé

Relecture : Dr Jérôme Debacre, Dr Sylvie Barge - Formations sanitaires Tahiti Nui- Dr Valérie Ségalin, Centre de Protection Infantile – Direction de la santé

Validation : Dr Jérôme Pasche, pédiatre –CHPF – Dr Véronique Quétard, médecin urgentiste, CHPF

Source : adapté de « URGENCES MEDICALES A L'OCCASION D'UNE VACCINATION » Document de référence campagne de vaccination contre la grippe A H1N1

