



2019

Enquête RECAP

Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge



*Direction de la Santé
Publique de la Polynésie
française*

CCSAT

*Centre de Consultations
Spécialisées en Alcoologie
et Toxicomanie*

DEDS

*Dispositif d'Exploitation
des Données de Santé*

Le **Centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie (CCSAT)**, localisé à Papeete, est un service actif de la Direction de la santé depuis 1984. Il s'agit du **seul service spécialisé en addictologie de la Polynésie française**. Il assure, sur tout le territoire polynésien, un accompagnement et des soins spécialisés pour toutes personnes confrontées à une ou plusieurs addictions, avec ou sans produit.

Le **Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge (RECAP)** est un **recueil de données continu** au sujet des patients venus chercher de l'aide auprès de structures de soins spécialisées dans la prise en charge des addictions (les CSAPA en France métropolitaine et dans les DOM). Il s'appuie notamment sur un noyau minimum commun de questions à utiliser par tous les intervenants du champ des addictions. Avec cet outil, le CCSAT intègre un dispositif de mesures déjà éprouvé. Outre la mise en place **d'indicateurs de santé permettant d'avoir une vision plus complète des problématiques d'addiction** sur le territoire polynésien, cet outil a vocation à harmoniser les recueils afin de fournir des **données comparables** à l'échelle locale et nationale.

La présente synthèse porte sur les résultats de l'analyse de l'activité du CCSAT recueillis du **1^{er} mars 2019 au 29 février 2020**. Elle concerne un effectif total de **1281 patients consommateurs**.

Principales caractéristiques sociodémographiques des patients

50% des patients du CCSAT avaient **entre 11 et 30 ans**, contre **26%** relevé lors de l'enquête RECAP réalisée en France métropolitaine en 2018 (RECAP-Fr). **75%** étaient des **hommes** (idem RECAP-Fr). **57%** avaient au plus le **BEPC** et **18%** avaient un niveau supérieur au **baccalauréat**.

57% des patients du CCSAT ne déclaraient **aucune profession** au moment de l'entretien (vs **30%** pour RECAP-Fr). Au cours des 6 derniers mois, **35%** déclaraient être **étudiants, élèves ou personnes en stages non rémunéré** (vs **8%** pour RECAP-Fr), **24%** en **CDI** (vs **34%** pour RECAP-Fr) et **23%** appartenaient aux **autres inactifs ou exerçants un emploi non rémunéré** (vs **19%** pour RECAP-Fr). **36%** des patients du CCSAT déclaraient des **revenus d'emplois** au cours des 6 derniers mois (vs **40%** pour RECAP-Fr), **27%** disposaient **d'autres ressources, sans revenu** (vs **17%** pour RECAP-Fr) et **26%** bénéficiaient des **ressources d'un tiers** (vs **6%** pour RECAP-Fr).

53% des patients du CCSAT n'avaient **aucun enfant** (idem RECAP-Fr). **36%** des patients vivaient **en couple, avec ou sans enfant**, au moment de l'entretien (vs **30%** pour RECAP-Fr), **33%** déclaraient **vivre avec leurs parents** (vs **20%** pour RECAP-Fr) et, particularité polynésienne, **18%** **vivaient avec d'autres membres de leur famille**. **99,5%** (vs **98%** pour RECAP-Fr) des patients du CCSAT **disposaient d'un logement** dans les 6 mois à venir. Il s'agissait d'une **solution durable chez des proches** pour **52%** (vs **19%** pour RECAP-Fr) ou d'un **logement durable indépendant** pour **39%** (vs **63%** pour RECAP-Fr).

Paramètres de santé des patients

11% des patients du CCSAT suivaient un **traitement médicamenteux** spécifique aux addictions (vs **13%** pour RECAP-Fr) et **1%** un **traitement de substitution aux opiacés** (vs **23%** pour RECAP-Fr). L'usage de drogue par **voie intraveineuse** ne concernait qu'**1%** des patients (vs **14%** pour RECAP-Fr). **28%** des patients du CCSAT avaient été **testés pour le VIH** au cours de leur vie (vs **19%** pour RECAP-Fr) et **17%** pour l'**hépatite C** (vs **19%** pour RECAP-Fr). Au moins **64%** des patients du CCSAT bénéficiaient d'une **vaccination complète contre l'hépatite B**.

7% des patients du CCSAT présentaient des **antécédents d'hospitalisation psychiatrique** hors sevrage (vs **20%** pour RECAP-Fr) et **11%** avaient déjà fait **au moins une tentative de suicide** (vs **17%** pour RECAP-Fr). **16%** avaient déjà été **incarcérés** (vs **27%** pour RECAP-Fr), en général **une seule fois (60%)** ou pour une **durée cumulée n'excédant pas 12 mois (54%)**.

Prise en charge des patients

L'activité du CCSAT présentait **50%** de **nouvelles entrées**. Pour **95%** d'entre elles, la fiche RECAP était remplie dans le **premier mois de la prise en charge**. Tous suivis confondus, **64%** des patients étaient **suivis depuis moins de 7 mois**. **44%** des patients étaient orientés vers le CCSAT dans le cadre d'une **procédure judiciaire** (vs **17%** pour RECAP-Fr), **30%** l'étaient par le **milieu scolaire ou universitaire** (vs **2%** pour RECAP-Fr) et **16%** prenaient **l'initiative de la prise en charge** (vs **43%** pour RECAP-Fr).

En croisant simultanément les caractéristiques de la consommation à l'origine de la prise en charge des patients du CCSAT, **3 profils de patients** pouvaient être mis en évidence :

- « **Produits inhalables** » : **63%** des patients (N=799), essentiellement **mineurs**, consommaient presque tous le produit à l'origine de la prise en charge **en le fumant ou en l'inhalant**. L'ensemble des consommateurs de **tabac**, la plupart de ceux qui consommaient du **cannabis** et une grande part des consommateurs de **méthamphétamine** appartenaient à ce profil. **59%** d'entre eux présentaient une **dépendance** au produit.

- « **Produits ingérables** » : **34%** des patients (N=436), généralement de **moins de 45 ans**, consommaient presque tous le produit à l'origine de la prise en charge en **le mangeant ou en le buvant**. La quasi-totalité des consommateurs d'**alcool** et l'ensemble de ceux qui consommaient d'**autres opiacés** appartenaient à ce profil. **47%** d'entre eux présentaient un **usage nocif** du produit.
- « **Addictions sans produits** » : **3%** des patients (N=42), essentiellement **mineurs** et occasionnellement de **plus de 44 ans**, regroupait la totalité des patients pris en charge pour une **cyber-addiction**, une addiction aux **jeux d'argent**, un **trouble du comportement alimentaire** ou une **autre addiction sans produit**. **88%** des patients présentaient un usage allant de **nocif** à la **dépendance**.

87% des patients du CCSAT déclaraient **au moins une consommation problématique dans les 30 derniers jours** (vs **82%** pour RECAP-Fr). Parmi les consommateurs, **55%** ne déclaraient qu'**un seul produit**.

Le même type d'analyse concernant les types de produits posant le plus de problèmes aux patients du CCSAT et le nombre de produits consommés dans les 30 derniers jours, permettait de mettre en évidence **4 profils de patients** :

- « **Cannabis** » : **52%** des patients (N=583) présentaient quasiment tous une **consommation problématique de cannabis**. Aucun ne cumulait plus de 2 produits et **53%** déclaraient un **deuxième produit problématique**, en particulier une consommation d'**alcool (40%)** ou de **méthamphétamine (9%)**.
- « **Alcool et tabac** » : **35%** des patients (N=387) ne déclaraient généralement qu'un **seul produit problématique (85%)**, deux produits au plus. **69%** du groupe consommait de l'**alcool**, **35%** du **tabac** et **11%** présentait une **addiction sans produit** (hors jeux d'argent).
- « **Multi-consommateurs** » : **12%** des patients (N=131) consommaient généralement de **3 à 5 produits problématiques (96%)**. En dehors des opiacés et des hypnotiques ou tranquillisant, tous les produits étaient cités, en particulier le **cannabis (90%)**, l'**alcool (90%)**, le **tabac (79%)** et les **méthamphétamines (21%)**.
- « **Drogues dures** » : **1%** des patients (N=12) constituait une exception parmi les patients du CCSAT. Ce groupe rassemblait l'**ensemble des consommateurs d'opiacés (75%)** ou de **produits hypnotiques ou tranquillisants (42%)**. Les consommations de **cannabis (25%)** et d'**alcool (25%)** y étaient plus rares et **aucun** de ces patients ne consommait de **méthamphétamines** ni ne présentait une **addiction sans produit**.

Quatre grands profils de répondants

Les résultats de cette enquête auront permis de dégager **quatre grands « profils » des patients** traités au CCSAT dans le cadre de leurs problématiques d'addictions :

- Les « **jeunes** » : **40%** des patients (N=507), le plus souvent **mineurs, nouvellement pris en charge** et orientés par le **milieu scolaire ou universitaire**, appartenaient essentiellement au profil de consommation par « **inhalation** » et consommaient préférentiellement du **cannabis**, parfois du **tabac** et éventuellement des **méthamphétamines**. La plupart d'entre eux **avaient consommé le produit à l'origine de la prise en charge** dans les 30 derniers jours. Ils ne présentaient que de **rares problèmes de santé ou antécédents psychiatriques ou judiciaires**.
- Les « **longs suivis** » : **29%** des patients (N=377), tous âgés de **18 à 64 ans**, essentiellement **masculins, peu diplômés** et **inactifs pour moitié**, étaient dans l'ensemble **déjà suivis ou en reprise de traitement**, avec une **durée de prise en charge étalée dans le temps**. Présentant souvent des **antécédents d'incarcération**, ils étaient en général orientés dans le cadre d'une **procédure de justice pré ou post-sentencielle**. Appartenant au profil de consommation par « **inhalation** » ou par « **ingestion** », la plupart **ne consommaient plus** le produit à l'origine de la prise en charge, ni d'autres produits depuis au moins 30 jours. Ils présentaient les plus forts taux de test pour le **VIH** et l'**hépatite C**.
- Les « **actifs** » : **27%** des patients (N=347), tous âgés de **19 à 63 ans**, présentant les **niveaux scolaires les plus élevés** et généralement une **activité professionnelle stable** et une **autonomie financière et résidentielle**, étaient le plus souvent **nouvellement pris en charge**, plus fréquemment à l'**initiative du patient**. Répartis également entre les profils de consommation par « **ingestion** » ou par « **inhalation** », la plupart **consommaient encore** le produit à l'origine de la prise en charge dans le mois précédent et la moitié des consommations problématiques correspondaient au profil « **alcool et tabac** ». Ils étaient plus souvent sous **traitement médicamenteux** et présentaient plus d'**antécédents d'hospitalisation ou de tentatives de suicide** qu'en moyenne.
- Les « **retraités** » : **4%** des patients (N=50), tous **retraités**, âgés d'**au moins 45 ans** et **indépendants** en termes de logement, étaient **nouvellement pris en charge** pour moitié, plus fréquemment à l'**initiative du patient**. Appartenant en majorité au profil de consommation par « **ingestion** », la plupart **consommaient encore** le produit à l'origine de la prise en charge dans les 30 derniers jours et la quasi-totalité des consommations problématiques correspondaient au profil « **alcool et tabac** ». On observait la plus grande part de patients sous **traitement médicamenteux** mais **aucun utilisateur de l'injection intraveineuse** et ces patients ne présentaient que de **rares antécédents d'ordre psychiatrique ou carcéral**.

75%
d'hommes

1281
patients

50%
de jeunes de
11 à 30 ans


18%
ayant un niveau
supérieur au bac

57%
sans profession

53%
sans enfant

0,5%
sans domicile fixe


Situation professionnelle



Environnement familial



Suivi médical



Antécédents



Orientation de la prise en charge




1281


patients

50%
de nouvelles entrées

3 profils de consommation à l'origine de la prise en charge



4 profils de consommation problématique dans les 30 jours



87%
ayant consommé dans le mois

55%
ayant consommé un seul produit

4 principaux profils de patients au CCSAT

40%	29%	27%	4%
Jeunes <ul style="list-style-type: none"> Mineurs Nouvelle entrée Orientation scolaire/universitaire Profil "Inhalation" Cannabis, tabac, méthamphétamines Consommation dans le mois Peu d'antécédents psychiatriques ou judiciaires 	Longs suivis <ul style="list-style-type: none"> 18 à 64 ans Homme Peu diplômé Souvent inactif Déjà suivi ou en reprise de traitement Antécédents d'incarcérations Profil "Inhalation" ou "Ingestion" Pas de consommation dans le mois Dépistés pour le VIH et l'hépatite C 	Actifs <ul style="list-style-type: none"> 19 à 63 ans Haut niveau scolaire Emploi et ressources stables Nouvelle entrée Consultation à initiative personnelle Profil "Inhalation" ou "Ingestion" Consommation dans le mois Profil "Alcool et tabac" Traitement médicamenteux Antécédents psychiatriques 	Retraités <ul style="list-style-type: none"> 45 ans ou plus Logement indépendant Nouvelle entrée Consultation à initiative personnelle Profil "Ingestion" Consommation dans le mois Profil "Alcool et tabac" Traitement médicamenteux Peu d'antécédents psychiatriques ou judiciaires



Direction de la santé en Polynésie française

58, Rue des Poilus Tahitiens / B.P. 611 Papeete - 98713 Tahiti

Tél. : (+689) 40.46.00.05 - Fax : (+689) 40.43.00.74

E-mail : secretariat@sante.gov.pf