

LES DIFFÉRENTS SCHÉMAS VACCINAUX



VACCIN PFIZER

Toutes personnes de 12 ans et plus

Aucun antécédant de COVID :

2 doses pour que la vaccination soit complète (la 2ème injection doit survenir 3 à 6 semaines après la première)



Personnes ayant fait une infection datée et avérée par le SARS-CoV-2 (symptomatique ou non) :

Entre le 0 et 3ème mois
post-infection

Entre le 3ème et le 6ème mois
post-infection
(sans dépasser le 6ème mois)

Plus de 6 mois
post-infection

Report de la vaccination
au 3ème mois

ou

1 seule dose
de vaccin

ou

2 doses de
vaccin

Les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et qui présentent une infection par le SARSCoV2 avec PCR positive dans les jours qui suivent cette première vaccination :

Entre 3 et 6 mois après avoir été
confirmé positif à la covid-19

2ème injection

! Un délai d'attente de 7 jours est nécessaire après la vaccination pour être considéré(e) comme vacciné(e) quelque soit le nombre de doses administrées.



VACCIN JANSSEN

Toutes personnes de 18 ans et plus

Aucun antécédant de COVID :

Une seule injection est nécessaire

Vaccination
(1 seule dose)

Personnes ayant fait une infection datée et avérée par le SARS-CoV-2 (symptomatique ou non) :

Entre le 0 et 3ème mois
post-infection

À partir du 3ème mois et
6ème mois post-infection

Report de la vaccination
au 3ème mois

ou

1 seule dose
de vaccin

! Un délai d'attente de 14 jours est nécessaire après la vaccination pour être considéré(e) comme vacciné(e) quelque soit le nombre de doses administrées.