

LES DIFFÉRENTS SCHÉMAS VACCINAUX



VACCIN PFIZER

Toutes personnes de 12 ans et plus

Aucun antécédant de COVID :

2 doses pour que la vaccination soit complète (la 2ème injection doit survenir 3 à 6 semaines après la première)



Personnes ayant fait une infection datée et avérée par le SARS-CoV-2 (symptomatique ou non) :

Entre le 0 et 2ème mois post-infection

Entre le 2ème et le 6ème mois post-infection (sans dépasser le 6ème mois)

Plus de 6 mois post-infection

Report de la vaccination au 2ème mois

ou

1 seule dose de vaccin

ou

2 doses de vaccin

Les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et qui présentent une infection par le SARSCoV2 avec PCR positive dans les jours qui suivent cette première vaccination :

Entre 2ème et 6ème mois post-infection (sans dépasser le 6ème mois)

2ème injection

! Un délai d'attente de 7 jours est nécessaire après la 2ème dose pour être considéré(e) comme vacciné(e) quelque soit le nombre de doses administrées.



VACCIN JANSSEN

Toutes personnes de 18 ans et plus

Aucun antécédant de COVID :

Une seule injection est nécessaire

**Vaccination
(1 seule dose)**

Personnes ayant fait une infection datée et avérée par le SARS-CoV-2 (symptomatique ou non) :

Entre le 0 et 2ème mois post-infection

Entre le 2ème et le 6ème mois post-infection (sans dépasser le 6ème mois)

Report de la vaccination au 2ème mois

ou

1 seule dose de vaccin

! Un délai d'attente de 14 jours est nécessaire après la vaccination pour être considéré(e) comme vacciné(e) quelque soit le nombre de doses administrées.