

# LES CONTRE-INDICATIONS À LA COVID-19



## Contre-indication absolue quel que soit le vaccin :

- Antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates
- Réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique
- Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19
- Recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré...)

## Contre-indication absolue supplémentaires pour le vaccin JANSSEN :

- Femme enceinte et allaitante
- Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire
- Personnes de moins de 18 ans

## Contre-indication temporaires (report de la vaccination) :

- Syndrome infectieux (ou cas contact symptomatique)
- Avoir reçu un autre vaccin les 3 dernières semaines
- Avoir eu la COVID dans les 2 derniers mois
- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2
- Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.