


Le taux de consultation pour syndrome dengue-like a fortement augmenté fin août - début septembre (S31 à S34), correspondant au pic de la vague 2021 de Covid-19. Depuis S35, ce taux diminue fortement. En novembre, ce taux vacille entre 1 et 2%.

! La surveillance syndromique est un système **non spécifique** permettant de dégager des tendances de consultations par syndrome et non par pathologie.

LEPTOSPIROSE

Cas confirmés de leptospirose ► 1 sur 48 demandes (et 2 cas probables)



Après un pic fin avril (S16-S17), le nombre de cas de leptospirose notifié ces derniers mois demeure faible.

Prévention de la leptospirose

- Port de gants et de chaussures fermées/bottes lors des activités à risque (jardinage/ fa'a'apu, agriculture, pêche en eau douce)
- Evitez de se baigner en eau douce lorsqu'on est porteur de plaies et limiter les contacts des muqueuses avec l'eau
- Désinfection des plaies après exposition à risque
- Lutter contre les rongeurs, (gestion des déchets)

! Mesures à renforcer à l'issue des périodes de fortes pluies
! Vigilance renforcée lors de la pratique de loisirs nautiques (baignade, canyoning, pêche en rivière, etc.)
! Consulter sans délai un médecin en cas d'apparition de symptômes (en signalant l'activité à risque pratiquée).


GASTROENTERITES (GEA) ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) : survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

Prévention des GEA

- Hygiène des mains après passage aux toilettes, manipulation de terre ou d'objets souillés et avant manipulation des aliments.
- Lavage des fruits et légumes frais à l'eau courante propre et potable avant de les préparer et de les consommer
- Nettoyage et désinfection quotidienne des toilettes et poignées de portes dans l'entourage d'un malade.
- Conserver les aliments frais à température inférieure à 4°C et consommer viandes hachées et volailles cuites à cœur.
- Les préparations à base d'œufs non cuits (mayonnaises, crèmes, pâtisseries) sont à maintenir à une température < 4°C et à consommer rapidement.

! En cas de diarrhées et/ou vomissements importants, réhydrater la personne et consulter un médecin.



La proportion de consultations pour gastroentérite auprès des médecins du réseau sentinelle reste en moyenne aux alentours de 2%, après un pic à environ 6% en début juin.

Nb de cas	S47	S48	Détail
Diarrhée /GEA	1	1	Salmonelles à Tahiti
TIAC	0	1	TIAC à Tubuai

SIGNALEMENTS

Suspicion de Rougeole :

Un cas a été signalé comme suspect de rougeole à Huahine. Le patient, âgé de 3 ans, présentait une éruption maculopapuleuse non prurigineuse ayant débuté sur le visage puis s'était étendue au torse. Il était apyrétique, sans toux, ni conjonctivite, ni catarrhe, ni koplick. L'état général était conservé.

Suite à cela, le patient a été vacciné contre la rougeole et des prélèvements sanguin et naso-pharyngé ont été demandés pour analyses. La rougeole, la dengue, la leptospirose et le zika sont des pistes qui ont été écartées par leur résultat négatif. Une analyse au Parvovirus B19 est en cours.

Pour rappel :

- La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire.
Les signes évocateurs de la rougeole sont les suivants :
- Fièvre,
 - Exanthème maculo-papuleux,
 - Toux,

- Coryza,
- Conjonctivite,
- Présence du signe de Koplik.

Recommandations :

- Il est vivement recommandé de réaliser un prélèvement biologique pour confirmer/infirmier la suspicion,
- Eviction de toute collectivité jusqu'à 5 jours à partir du début de l'éruption,
- Application stricte des mesures d'hygiène avec lavage des mains, nettoyage des jouets et des surfaces,
- Vaccination des sujets contacts non protégés (trivalent dans les 72h après le contact),
- Vaccination ROR obligatoire à 12 mois suivie d'une deuxième injection entre 16 et 18 mois.

Calendrier des vaccinations 2021 :

<https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>

BUREAU DE VEILLE SANITAIRE

Dr Anne-Marie McKenzie, Aurélie Vigouroux, Moerava Chiu, Hélène Laborde, Laurence Mataitai, Tevairumuna Ori, Tahia Chanzi, Christophe Ricard

Tel : 40 48 82 01

Fax : 40 48 82 12

E-mail : veille@sante.gov.pf

Astreinte médicale de veille sanitaire

Tel : 87 70 65 02

(Hors heures ouvrables)