



Ce bulletin est réalisé grâce aux données des médecins et infirmiers du réseau sentinelle, des structures de la direction de la santé (dispensaires, infirmeries, hôpitaux périphériques et CME), du Centre Hospitalier du Taaone, des laboratoires privés et public et du service des armées.


GRIPPE

Epidémie de grippe A (H3N2) déclarée en semaine 51

Cas confirmés ► Depuis le début de l'épidémie, 344 cas de grippe ont été déclarés (+ 89 cas en S1 et S2).

L'épidémie semble se stabiliser avec une diminution du nombre de nouveaux cas en semaine 2. Les relevés des prochaines semaines devraient nous apporter plus d'éléments sur cette tendance.

Nombre de cas de grippe en Polynésie française par semaine, sur les 12 derniers mois semaines (S2 2021 - S2 2022)



D'après les données du CHPf, 153 personnes diagnostiquées pour grippe ont été hospitalisées, dont 18 en réanimation. Toutes les tranches d'âge sont touchées, la moitié des patients hospitalisés ont moins de 60 ans. Parmi les personnes hospitalisées, 6 décès ont été rapportés. Des investigations complémentaires sont en cours autour de ces cas.

! En complément de la vaccination, appliquer strictement les mesures barrières et les mesures d'hygiène pour se protéger, protéger ses proches et limiter la circulation du virus de la grippe.

Retrouvez le communiqué de presse de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021/2022 en Polynésie:

<https://www.service-public.pf/dsp/2021/10/30/campagne-vaccination-grippe/>

Syndrome grippal en France

- Persistance de la circulation des virus grippaux avec des disparités territoriales.
- Co-circulation des virus grippaux A(H1N1)pdm09 et A(H3N2).
- Passage en phase post-épidémique de La Réunion et Mayotte.

Voir détails dans le lien ci-après :


<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-2.-saison-2021-2022>

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÛES (IRA)

IRA : fièvre ou sensation de fièvre d'apparition brutale, signes respiratoires ou ORL, courbatures/myalgies, asthénie, céphalées

IRA ► 900 consultations rapportées sur 3095 consultations par les médecins du réseau sentinelle.

Proportion de consultations pour syndrome IRA auprès des médecins du réseau sentinelle de Polynésie française par semaine semaines (S02 2021 - S02 2022)



Après un pic à près de 33% En semaine 1, le taux de consultations pour motif IRA auprès des médecins du réseau sentinelle diminué à 23,5% en semaine 2.

Ces données sont le reflet de la combinaison de la vague épidémique de Covid-19 Omicron et de l'épidémie de grippe A, déclarée depuis le 20 décembre en Polynésie.

Prévention des infections respiratoires aiguës

Porter un masque en cas de toux.

- Se laver fréquemment les mains
- Utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter immédiatement dans une poubelle fermée puis se laver les mains.
- Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes
- Aération de l'espace de vie
- Les sujets fragiles (nourrissons, personnes âgées ou à risque, femmes enceintes) doivent éviter tout contact avec les personnes symptomatiques.

! Consulter sans délai un médecin en cas d'apparition de symptômes.

D'après les données du CHPf, nous enregistrons en semaine 1 et 2 une circulation de SARS-CoV-2, Influenza A(H3), Rhino/Entérovirus (Picornavirus), Parainfluenza 3 et Coronavirus 229E.

COVID-19

! En complément de la vaccination, appliquer strictement les mesures barrières et les mesures d'hygiène pour se protéger, protéger ses proches et limiter la circulation du SARS-CoV-2, souche historique et variants.

Informations disponibles sur le site de la Direction de la santé :

<https://www.service-public.pf/dsp/covid-19>

DENGUE


Syndrome dengue-like : fièvre élevée ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) d'apparition brutale ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

⇒ Prescrire une RT-PCR (ou un test NS1) jusqu'à J7 du début des symptômes et une sérologie au-delà de cette période.

Cas confirmé : syndrome "dengue-like" confirmé virologiquement par un test diagnostic positif (RT-PCR / AgNS1)

Depuis juillet 2020, absence de circulation active du virus de la dengue en Polynésie française.

Cas confirmés ► 0 sur 24 demandes



Le taux de consultation pour syndrome dengue-like a fortement augmenté en août septembre 2021, correspondant au pic de la vague delta de Covid-19. De septembre à décembre, ce taux vacille et retrouve son niveau de base entre 1 et 2%. Fin décembre, le nombre de consultations pour syndrome dengue-like recommence à augmenter pour atteindre un taux de 7% en semaine 2.

! La surveillance syndromique est un système **non spécifique** permettant de dégager des tendances de consultations par syndrome et non par pathologie.

Les syndromes provoqués par des pathologies comme la dengue, le Covid-19 et la grippe, pouvant parfois être similaires, il n'est pas étonnant d'observer une augmentation des consultations pour motif dengue-like en période épidémique de Grippe / Covid19.


Prévention de la dengue

- Se protéger contre les piqûres de moustiques, particulièrement les personnes virémiques afin de réduire le risque de transmission secondaire du virus à son entourage (usage de moustiquaires)
- Lutter contre les gîtes larvaires en éliminant les eaux stagnantes dans son environnement au moins une fois par semaine
- Consulter rapidement son médecin en cas d'apparition de symptômes.

! Ces mesures sont à renforcer en période de fortes pluies

LEPTOSPIROSE

Cas confirmés de leptospirose ► 1 sur 50 demandes



Après un pic fin avril, le nombre de cas de leptospirose notifiés ces derniers mois demeure faible.


Prévention de la leptospirose

- Port de gants et de chaussures fermées/bottes lors des activités à risque (jardinage/ fa'a'apu, agriculture, pêche en eau douce)
- Evitez de se baigner en eau douce lorsqu'on est porteur de plaies et limiter les contacts des muqueuses avec l'eau
- Désinfection des plaies après exposition à risque
- Lutter contre les rongeurs, (gestion des déchets)

! Mesures à renforcer à l'issue des périodes de fortes pluies
! Vigilance renforcée lors de la pratique de loisirs nautiques (baignade, canyoning, pêche en rivière, etc.)
! Consulter sans délai un médecin en cas d'apparition de symptômes (en signalant l'activité à risque pratiquée).

GASTROENTERITES (GEA) ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) : survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.



Après un pic à environ 6% en début juin, la proportion de consultations pour gastroentérite auprès des médecins du réseau sentinelle reste en moyenne aux alentours de 2%.

D'après les données du CHPf, nous enregistrons en semaine 1 et 2 des GEA à Adenovirus, Norovirus, Astrovirus.

Nb de cas	S1	S2	Détail
Diarrhée /GEA	0	1	Salmonelle localisée à Tahiti
TIAC	0	0	

Prévention des GEA

- Hygiène des mains après passage aux toilettes, manipulation de terre ou d'objets souillés et avant manipulation des aliments.
- Lavage des fruits et légumes frais à l'eau courante propre et potable avant de les préparer et de les consommer
- Nettoyage et désinfection quotidienne des toilettes et poignées de portes dans l'entourage d'un malade.
- Conserver les aliments frais à température inférieure à 4°C et consommer viandes hachées et volailles cuites à cœur.
- **Les préparations à base d'œufs non cuits (mayonnaises, crèmes, pâtisseries) sont à maintenir à une température < à 4°C et à consommer rapidement.**

! En cas de diarrhées et/ou vomissements importants, réhydrater la personne et consulter un médecin.

BUREAU DE VEILLE SANITAIRE

Dr Anne-Marie McKenzie, Aurélie Vigouroux, Moerava Chiu, Hélène Laborde, Tahia Chanzi, Catherine Teai

Tel : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

E-mail : veille@sante.gov.pf

Astreinte médicale de veille sanitaire
Tel : 87 70 65 02
(Hors heures ouvrables)

BSS n°1-2022 du 03/1/2022 au 16/01/2022 (semaines 1 et 2)

Retrouvez tous les BSS sur le site de la direction de la santé : <https://www.service-public.pf/dsp/surveillance-veille-sanitaire>