



BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE COVID-19 POLYNÉSIE FRANÇAISE

N°113 – Semaine 40/2022, période du 3/10/09 au 9/10/2022

Données consolidées au 11/10/2022

Ce bulletin est réalisé par la Cellule Episurveillance de la Plateforme COVID-19 grâce aux données transmises par l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française ainsi que du Réseau Sentinelles de médecins généralistes

Réalisation : Noémie LABOURDETTE, Henri-Pierre MALLET - covidpf-episurveillance@sante.gov.pf - Tél : 40.48.82.78/29



Points forts S40

- Le nombre de nouveaux cas et l'incidence restent à des niveaux très faibles en S40 (10 cas, incidence à 4/100k)
- ⇒ **Cette situation épidémiologique correspond au niveau minimum d'alerte « 1 » en PF**
- Cependant, la reprise de la circulation virale se confirme en métropole et dans plusieurs pays d'Europe, avec des incidences dépassant 500/100k
- ⇒ **Le risque de reprise épidémique à la faveur de cas importés est important**
- ⇒ **Un rappel vaccinal (3° ou 4° dose) est fortement recommandé pour toutes les personnes vulnérables dont la dernière injection date de plus de 6 mois (plus de 60 ans et personnes à risque).**

Indicateurs clés des semaines 39 et 40/2022

Indicateurs	S39/22	S40/22	Tend ^{ce}
Nombre de nouveaux cas dans la semaine	10 (-33%)	10	→
Taux d'incidence pour 100k personnes/7 jours	4	4	→
Nombre total de tests dans la semaine	111	310	↗
Taux de positivité global	9%	3,2%	→
Taux de dépistage pour 100k personnes/7 jours	40	111	↗
Hospitalisations en cours pour Covid	0	0	→
Dont nombre d'hospitalisations en cours pour Covid en réanimation	0	0	→
Nombre de décès dans la semaine	0	0	→
Nombre de doses injectées par semaine	237	312	→
Part de la population ≥ 12 ans ayant reçu un schéma initial complet	81,7%	81,7%	→
Part de la population ≥ 12 ans ayant reçu une 3° dose	49,4%	49,3%	→
Part de la population ≥ 60 ans avec dernière dose dans les 6 mois	20,7%	19,7%	↘
Part de la population ≥ 80 ans avec dernière dose dans les 6 mois	26,2%	25,0%	↘




Données de dépistage

Le nombre total de nouveaux cas confirmés en S39 est de 10, tous à Tahiti. Parmi ces cas, 5 sont des voyageurs de provenance internationale.


Le taux d'incidence hebdomadaire reste à un niveau très bas, de 4/100k pour l'ensemble du territoire et de 5/100k pour l'île de Tahiti (figure 1).

Figure 1. Incidence des nouveaux cas de Covid dans les 7 derniers jours, pour 100k habitants, PF, S19 à 39/2022



Les taux de dépistage et de positivité restent très bas (figure 2).

Figure 2. Nombre de tests réalisés et taux de positivité, Pf, S29/20 à S40/22



Données des établissements de soins

En S39, le CHPF recense 822 passages aux urgences dont 15 ont bénéficié d'un test de dépistage Covid. On ne recense aucun cas positif parmi ces passages aux Urgences et 2 parmi les 39 autres prélèvements réalisés au CHPF. Il n'y a actuellement plus aucun patient hospitalisé pour Covid.



Vaccination

L'activité de vaccination dans les centres reste très faible (312 injections en S40). La couverture vaccinale globale n'évolue plus (81,7% des plus de 12 ans), mais surtout le taux de rappels chez les plus de 60 ans reste très insuffisant.

Surveillance des variants

En S40, 1 seule souche a pu être criblée, identifiée comme BA.5.


Situation internationale

La recrudescence de cas est confirmée en Europe, au Canada et dans certains pays d'Afrique (figure3). En France métropolitaine, l'incidence à ce jour est à 576/100k et le taux de positivité à 27,6%, et les admissions en soins conventionnels et en soins critiques sont également en augmentation.

Figure 3. Evolution des incidences hebdomadaires dans le monde

Week by week change of confirmed COVID-19 cases, Oct 9, 2022

The weekly growth rate on any given date measures the percentage change in number of confirmed cases over the last seven days relative to the number in the previous seven days.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Le variant Omicron est très largement majoritaire dans le monde. Le sous-variant BA.5 représente 91% des souches analysées en France et est également majoritaire au niveau mondial. Cependant, le sous-lignée BA.4.6 est en augmentation (5% en France), et en particulier aux Etats-Unis (13,9%), où d'autres souches émergent également (BA.7, BA.2.75). Ces sous-variants n'ont pour l'instant pas donné lieu à des alertes cliniques ni épidémiologiques.