

LA GALE

C'est une **infection de la peau causée par un parasite (*sarcoptes scabiei*) qui creuse des galeries dans la peau pour y pondre des œufs.**

Maladie très **contagieuse** (par contact direct entre humains ou par contact avec la literie, les vêtements, les meubles en tissu, les sièges auto etc.), elle se manifeste par des **démangeaisons** importantes surtout la nuit.

Elle peut toucher les **adultes**, les **enfants** et les **bébés**.

Le traitement nécessite de **traiter en même temps toute la famille** (les personnes atteintes de la gale, les proches vivants sous le même toit et les personnes en contact) même si les personnes ne se grattent pas.

Il est aussi nécessaire de **traiter l'environnement** du patient atteint de la gale : le linge, le mobilier, la voiture et le lieu de vie.



©Science Picture Co



DIRECTION
DE LA SANTÉ

PRÉCAUTIONS AVANT DE DÉBUTER LE TRAITEMENT :

- Couper les ongles des mains et des pieds
- Prévoir un ensemble de rechange propre, des moufles et des chaussettes pour éviter l'ingestion du produit après application au niveau des mains et des pieds du nourrisson

Le parasite de la gale n'est pas détruit par les solutions hydro-alcooliques (SHA)

1

DÉSINFECTION DU LIEU DE VIE



Nettoyer la maison
le jour même ou le
lendemain du traitement
des personnes



Ne pas utiliser le balai
niau pour éviter
d'éparpiller les parasites
dans le courant d'air



Passer un linge humide
sur les sols et les
surfaces avec le produit
de nettoyage habituel



Utiliser un insecticide
(par exemple A-Par®) sur les
poussettes, les sièges auto,
les matelas et les coussins,
les sièges auto pour enfant,
les canapés et fauteuils
en tissu



Les matelas et coussins s'ils
sont vieux, les jeter et les
changer pour des neufs
et propres

À refaire 8 jours après (le.....)

2

TRAITEMENT DE LA PERSONNE ATTEINTE ET DE L'ENTOURAGE FAMILIAL



3 produits peuvent être utilisés selon la prescription du médecin :



Permethrine TOPISCAB 5%®

(Prix à titre indicatif : 2 812 F CFP le tube.

Sur prescription, le reste à charge est de 844 F CFP).

Pour enfant âgé de plus de 2 mois et adulte (dont femme enceinte)

Après le bain du soir, sécher et appliquer le produit sur le corps, le cuir chevelu et sous les ongles, laisser agir pendant 8 h puis rincer à l'eau et au savon et mettre des vêtements propres décontaminés.

Faire une seconde application 8 jours après (le)

Benzoate de benzyle ASCABIOL® 10% émulsion pour application cutanée

(Prix à titre indicatif : 2 311 F CFP le flacon. Sur prescription, le reste à charge est de 693 F CFP).

Enfant de moins de 2 ans et de plus de 1 mois :

Après le bain du soir, sécher et appliquer le produit sur le corps, le cuir chevelu et sous les ongles, laisser agir pendant 6 à 12 h puis rincer à l'eau et au savon et habiller le bébé avec des vêtements propres décontaminés.

Faire une seconde application 8 jours après (le.....)

Enfant de plus de 2 ans et adulte dont femme enceinte (au-delà du 1^{er} trimestre) :

Après le bain du soir, sécher et appliquer le produit sur l'ensemble du corps et sous les ongles. Laisser agir 15 minutes puis appliquer de nouveau une couche de produit sur l'ensemble du corps. Garder le produit sur la peau pendant 24 h puis rincer à l'eau et au savon et habiller l'enfant avec des vêtements propres décontaminés.



Faire une seconde application 8 jours après (le.....)

Pendant le temps de pose du produit, éviter de se laver les mains pour ne pas éliminer l'insecticide. Penser à remettre du produit si on a changé

IVERMECTINE (Prix à titre indicatif : 1 570 F CFP la boîte de 4 comprimés.

Sur prescription, le reste à charge est de 471 F CFP).

Pour enfant de plus de 15 kg et adulte dont femme allaitante (pour la femme enceinte sur avis médical si traitement topique insuffisant).

Prendre.....cp le 1^{er} jour du traitement puis reprendre.....cp 8 jours après.



3

TRAITEMENT DU LINGE DE LA FAMILLE



Cela concerne les vêtements, sous-vêtements, chaussettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, pareu, tifaifai etc. utilisés au cours des 7 derniers jours.

NE PAS SECOUER LE LINGE CONTAMINÉ POUR ÉVITER LA DISSÉMINATION DU SARCOPTE DANS LA PIÈCE.

Il faut :



À refaire 8 jours après (le.....)

Éviter de pulvériser l'A-PAR® en présence d'une personne asthmatique ou près d'une flamme.

