




Ce bulletin est réalisé grâce aux données des médecins et infirmiers du réseau sentinelle, des structures de la direction de la santé (dispensaires, infirmeries, hôpitaux périphériques et CME), du Centre Hospitalier de Polynésie française, des laboratoires privés et publics et du service de santé des armées.

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÛES (IRA)

IRA : fièvre ou sensation de fièvre d'apparition brutale, signes respiratoires ou ORL, courbatures/myalgies, asthénie, céphalées

IRA ► 1398 consultations rapportées sur 11949 consultations effectuées par les médecins du réseau sentinelle.

Proportion de consultations pour syndrome IRA auprès des médecins du réseau sentinelle de Polynésie française par semaine semaines (S44 2021 - S44 2022)



Durant les semaines 37 à 44, le taux de consultations pour motif IRA oscille entre 9,8% et 14,4%.

D'après les données du CHPf, entre les semaines 37 et 44, il a été observé, en plus du SARS-CoV-2, une circulation d'Adénovirus, de Coronavirus 229E, de Coronavirus communs, de Rhino/Entérovirus, de Virus Parainfluenza 1-2-3 et 4, et de VRS. Il est à noter qu'un patient s'est révélé positif au virus de la **grippe A/H3** durant la semaine 37.

Prévention des infections respiratoires aiguës

- Porter un masque en cas de toux.
- Se laver fréquemment les mains.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter immédiatement dans une poubelle fermée puis se laver les mains.
- Maintenir une distance minimum d'un mètre avec les autres personnes
- Aération de l'espace de vie
- Les sujets fragiles (nourrissons, personnes âgées ou à risque, femmes enceintes) doivent éviter tout contact avec les personnes symptomatiques.

! Consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes.

Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire Covid-19 Polynésie française n°117 de la semaine 44 :

« Le nombre de cas confirmés (N=33) en S44 augmente de 22% par rapport à la semaine dernière et la proportion des cas importés diminue... »

Le risque de reprise épidémique à la faveur de cas importés reste présent.

Une campagne de vaccination associant les vaccins contre la Covid (rappels avec vaccin bivalent) et contre la grippe a commencé. Un vaccinodrome sera installé au moins une fois par mois. »

<https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/actualites-covid/>

COVID-19

! En complément de la vaccination, appliquer strictement les mesures barrières et les mesures d'hygiène pour se protéger, protéger ses proches et limiter la circulation du SARS-CoV-2, souche historique et variants.

Informations disponibles sur le site de la Direction de la santé :

<https://www.service-public.pf/dsp/covid-19>

DENGUE

Syndrome dengue-like : fièvre élevée ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) d'apparition brutale ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

⇒ Prescrire une RT-PCR (ou un test NS1) jusqu'à J7 du début des symptômes et une sérologie au-delà de cette période.

Cas confirmé : syndrome "dengue-like" confirmé virologiquement par un test diagnostique positif (RT-PCR / AgNS1)

Depuis juillet 2021, absence de circulation active du virus de la dengue en Polynésie française.


► **0 cas confirmés** et 1 cas probable en S44

Prévention de la dengue

- Se protéger contre les piqûres de moustiques, particulièrement les personnes virémiques afin de réduire le risque de transmission secondaire du virus à son entourage (usage de moustiquaires)
- Lutter contre les gîtes larvaires en éliminant les eaux stagnantes dans son environnement au moins une fois par semaine
- Consulter rapidement son médecin en cas d'apparition de symptômes.

! Ces mesures sont à renforcer en période de fortes pluies


Proportion de consultations pour syndrome dengue auprès des médecins du réseau sentinelle de Polynésie française par semaine semaines (S44 2021 - S44 2022)



Durant les semaines 37 à 44, le taux de consultation pour syndrome dengue-like reste très bas, il oscille entre 0 et 1%.

LEPTOSPIROSE

Cas confirmés de leptospirose ► 7 sur 161 suspicions



Sur 8 semaines, 7 cas de leptospirose ont été confirmés, et il a été détectés 2 cas probables (IgM+).

La saison des pluies ayant débuté, la prudence est de mise durant les activités à risque d'exposition à la contamination de leptospirose après les épisodes de fortes pluies et intempéries.


Prévention de la leptospirose

- Porter des gants et de chaussures fermées/bottes lors des activités à risque (jardinage/ fa'a'apu, agriculture, pêche en eau douce)
- Eviter de se baigner en eau douce lorsqu'on est porteur de plaies et limiter les contacts des muqueuses avec l'eau
- Désinfection des plaies après exposition à risque
- Lutter contre les rongeurs, (gestion des déchets)

! Mesures à renforcer à l'issue des périodes de fortes pluies
! Vigilance renforcée lors de la pratique de loisirs nautiques (baignade, canyoning, pêche en rivière, etc.)
! Consulter sans délai un médecin en cas d'apparition de symptômes (en signalant l'activité à risque pratiquée).

GASTROENTERITES (GEA) ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) : survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.



A partir de S38 jusque S40, la proportion de consultations pour gastroentérite auprès des médecins du réseau sentinelle est en augmentation. A S40, on dénote un pic allant jusqu'à 9,4%. Cette proportion diminue ensuite progressivement jusqu'à 2,8% en S44.

Nb de cas en	Diarrhée/ GEA	TIAC	Détails
S37	1	0	Salmonelle à Tahiti
S38	5	0	2 salmonelles à Tahiti et épisode cas groupés de GEA à Hao
S39	3	0	Salmonelles à Tahiti
S40	1	0	Salmonelle à Tahiti
S41	2	0	1 salmonelle à Tahiti et 1 à Raiatea
S42	3	2	Salmonelles et TIAC à Tahiti
S43	0	0	/
S44	1	0	Salmonelle à Tahiti

Il est à noter également qu'un épisode de cas groupés de gastroentérites aiguës à rotavirus a été déclaré en semaine 38 à Hao, probablement dû à une transmission interhumaine.

Prévention des GEA

- Hygiène des mains après passage aux toilettes, manipulation de terre ou d'objets souillés et avant manipulation des aliments.
- Lavage des fruits et légumes frais à l'eau courante propre et potable avant de les préparer et de les consommer
- Nettoyage et désinfection quotidienne des toilettes et poignées de portes dans l'entourage d'un malade.
- Conservation des aliments frais à température inférieure à 4°C et consommation viandes hachées et volailles cuites à cœur.
- **Les préparations à base d'œufs non cuits (mayonnaises, crèmes, pâtisseries) sont à maintenir à une température < à 4°C et à consommer rapidement.**

! En cas de diarrhées et/ou vomissements importants, réhydrater la personne et consulter un médecin.

AUTRES SIGNALEMENTS

- ❖ Déclaration d'un cas de **légionellose** en S44, l'investigation est en cours.
- ❖ Nouvelles déclarations de cas de **VIH** cumulées en S41, S42 et S43. Sur 2022, il a été comptabilisé **17 cas de VIH** au total à ce jour.

BUREAU DE VEILLE SANITAIRE

Dr André WATTIAUX, Moerava CHIU, Tereva RENETAUD, Manutaia CARBAYOL-TERIITAHU

Tel : 40 48 82 01

Fax : 40 48 82 12

E-mail : veille@sante.gov.pf

Astreinte médicale de veille sanitaire

Tel : 87 70 65 02

(Hors heures ouvrables)

BSS n°10-2022 du 12/09/2022 au 06/11/2022 (semaines 37 à 44)

Retrouvez tous les BSS sur le site de la direction de la santé : <https://www.service-public.pf/dsp/espace-pro-2/surveillance-epidemiologique>