

Annexe 4

POPULATION ÉLIGIBLE A LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE ET CONTRE LA COVID-19

GROUPES DE POPULATION			OBSERVATIONS
Personnes de 60 ans et plus			TOUS
Personnes en Longue Maladie (LM) (de 6 mois à 60 ans)			Se référer à la « Liste des pathologies chroniques à risque » (Annexe 5)
			ATTENTION : POUR LA GRIPPE SAISONNIERE Enfants âgés de 6 mois à 9 ans (dose de 0.5 mL) 1 ou 2 doses (2 s'il s'agit d'une primovaccination) à 1 mois d'intervalle et 1 dose annuelle ensuite. Enfants de 9 ans et plus (dose de 0.5 mL) : 1 dose annuelle
			ATTENTION : POUR LA COVID-19 Enfants à partir de l'âge de 5 ans, adolescents et adultes 1 dose de vaccin COMIRNATY OMICRON XBB 1.5 quelle que soit l'historique de la personne vis-à-vis de la Covid19 (vaccination, infection, ...) avec un <u>délai indicatif de 6 mois depuis la dernière dose/infection</u> (délai de 3 mois si immunodépression connue) Enfants âgés de 6 mois à 4 ans : avis spécialisé requis
Professionnels de santé & Autres professionnels			<ol style="list-style-type: none"> Personnel soignant ou autre professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère Personnel navigant (aérien et maritime) ou agents touristiques accompagnant des groupes.
Femmes enceintes			Quel que soit le terme de la grossesse Protection du bébé pour les premiers mois de vie
Personnes avec un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40	Taille en m	Poids en kg	Personne obèse Sans pathologie associée ou autre que celles listées dans l'Annexe 5
	1,50	90	
	1,60	100	
	1,70	115	
	1,80	130	
	1,90	145	
	2	160	
AUTRES			
1- Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement.			Tous quel que soit l'âge.
2-Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois ayant des facteurs de risque de grippe grave.			Entourage = milieu familial <i>(Personnes résidant sous le même toit, famille et proches, nourrices et toute personne en contact régulier avec le bébé).</i> Prématurés = Nourrissons nés avant le terme de la grossesse (<i>notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie</i>). Enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection longue durée.

Sources : vaccination-info-service.fr