DIRECTION
DE LA SANTÉ

Annexe 1- **Populations cibles** (grippe saisonnière et Covid-19)

1. Publics concernés

Les consignes propres à chaque vaccin figurent en point 2.

Groupes de population	Observations
Personnes de 60 ans et plus	Toutes les personnes de cette tranche d'âge.
Personnes en longue maladie (de 6 mois à 60 ans)	Se référer à la liste des pathologies chroniques à risque de complications en **annexe 2**.
Personnes avec un IMC ≥ 40	Personnes en situation d'obésité sans pathologie associée ou avec une pathologie autre que celles listées dans l'**annexe 2**. Repères de taille et de poids en **point 3**.
Femmes enceintes	Quel que soit le stade de la grossesse.
Professionnels de santé et navigants	Professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère. Professionnels navigants aériens et maritimes ou agents touristiques accompagnant des groupes.
Personnes en établissement	Toutes les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit l'âge.
Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque d'infection grave	Personnes résidant sous le même toit, famille et proches, nourrices et toute personne en contact régulier avec le bébé.

2. Consignes vaccinales

Grippe saisonnière

De 6 mois à 8 ans révolus : 1 ou 2 doses de 0,5 mL

Chez les enfants n'ayant pas été auparavant vaccinés contre la grippe saisonnière, une seconde dose est administrée après un intervalle d'au moins quatre semaines.

À partir de 9 ans : 1 dose de 0,5 mL

Covid-19

Enfants âgés de 6 mois à 11 ans révolus : avis spécialisé requis

À partir de 12 ans : 1 dose

Délai minimum : 6 mois depuis la dernière dose du vaccin ou la dernière infection.
Ce délai peut être réduit à 3 mois chez les personnes de 80 ans ou plus, les personnes immunodéprimées et les personnes à très haut risque, selon chaque situation médicale individuelle.

DIRECTION
DE LA SANTÉ

3. Repères de taille et de poids pour IMC ≥ 40

Taille (m)	Poids minimal pour un IMC de 40 (kg)
1,50	90
1,60	100
1,70	115
1,80	130
1,90	145
2,00	160

Sources : vaccination-info-service.fr et Haute Autorité de Santé.